

1912

Aus den akademischen Kinderkliniken zu Cöln.
(Direktor Prof. Dr. Siegert.)

Zur Pathogenese und Prognose der Säuglingstuberkulose.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

medizinischen Fakultät

der

K. B. Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen

vorgelegt von

Arnold Frankenau,

Arzt aus Nürnberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 11. Dezember 1912.



NÜRNBERG 1912.

Gedruckt bei Benedikt Hilz.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der
Universität Erlangen.

Referent: Herr Professor Dr. Jamin.

Dekan: Herr Professor Dr. Seitz.

Meinen Eltern.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Säuglingstuberkulose ist schon seit Jahren wissenschaftlich behandelt worden. Es lassen sich in der Geschichte ihrer Durchforschung zwei Perioden genau unterscheiden, die Zeit vor und nach Entdeckung der Pirquetschen Reaktion. In der Zeit vor 1907, vor dieser Entdeckung, gründet sich die ganze Lehre von der Säuglingstuberkulose auf Sektionen (Nägeli, Stirnimann, Hamburger und Sluka). Es wurden damals auf dem Sektionsisch schon viele Erfahrungen gewonnen; so spricht Stirnimann aus, daß bei keinem der Kinder, die im ersten Lebensjahr zur Sektion kamen, sich irgendwelche Heilungsvorgänge anatomisch nachweisen ließen. An der Wichtigkeit dieses Satzes ändern auch die wenigen, inzwischen bekannt gewordenen Ausnahmen nichts. Ebenso erkannte man in dieser Zeit schon, daß bei fast allen Fällen von Säuglingstuberkulose diese auch die Todesursache war, daß also Tuberkulose als Nebebefund bei Säuglingsleichen nicht oder wenigstens fast nie anzufinden war.

Vom klinischen Standpunkt aus hat die Säuglingstuberkulose Ibrahim im Jahre 1905 behandelt. Ibrahim hebt hervor, daß man die Diagnose meist nur vermuthungsweise stellen kann. Das einzig sichere Kriterium, der Bazillennachweis, sei beim Säugling sehr oft nicht möglich.

Ein anderes, schon damals bekanntes Hilfsmittel der Diagnose, die Kochsche Reaktion, hat sich trotz gewichtiger Empfehlungen (Schloßmann, Binswanger, Escherich) nicht einbürgern können. Einerseits war die Reaktion kaum anwendbar in den zahlreichen Fällen, wo die Säuglinge Fieber hatten, anderseits war sie wegen der zahlreichen Messungen, die nötig waren, nur in der Klinik,

nicht in der Poliklinik zu verwenden, und auch in der Klinik stellten sich der allgemeinen Anwendung der Reaktion die hohen Anforderungen gegenüber, die sie an die Arbeitskraft des Pflegepersonals stellte.

Durch die Pirquetsche Impfung wurde die Diagnostik der Säuglingstuberkulose auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Anfangs allerdings glaubte man, daß die Haut des Säuglings im ersten Lebensjahr nicht reaktionsfähig sei, bis Siegert nachwies, daß bei richtiger Technik und Anwendung unverdünnten Tuberkulins die Reaktion genau so eintrete wie bei älteren Individuen. Und wenn auch Hamburger nachweist, daß die Pirquetsche Reaktion nicht so empfindlich ist wie die Stichreaktion, so muß er selbst zugestehen, daß bei dem aktiven Charakter der Säuglingstuberkulose die Kutanreaktion praktisch völlig ausreicht und um so zuverlässiger sei, je jünger das Kind ist.

Nun wurden auch die Beobachtungen zahlreicher, und es zeigte sich, daß zwar nicht, wie Schloßmann anfangs schrieb, alle diejenigen Säuglinge, welche positiv reagierten, dem Tode verfallen waren, aber doch die weitaus überwiegende Mehrzahl derselben. Aus der Schloßmannschen Schule erschien dann eine Reihe von Arbeiten über Kindertuberkulose, als deren wichtigste wohl die verschiedenen Arbeiten von Engel und Bauer über Behandlung der Tuberkulose des Kindes mit Tuberkulininjektionen anzusprechen sind.

Es hatte sich dabei gezeigt, daß einige Fälle von Tuberkulose des ersten Lebensjahres am Leben geblieben waren, daß sich bei anderen, welche gestorben waren, anatomisch Zeichen beginnender Heilung nachweisen ließen.

An diese Aufsätze knüpfte sich eine lebhafte Diskussion, und die Frage der Tuberkulinbehandlung der Säuglinge ist noch nicht geklärt.

Immerhin hatte sich gezeigt, daß die Tuberkulose der Säuglinge nicht absolut tödlich ist.

Es erschienen nun von allen Seiten Veröffentlichungen über geheilte Säuglingstuberkulosen, und jetzt erst erhält man ein klareres Bild über die Mortalität der Erkrankung. Allerdings sind bei dem immerhin seltenen Vorkommen der Heilungen und bei der Verschiedenheit des Materials der einzelnen Untersucher die Angaben recht widersprechend; während Pfaundler die Mortalität mit 90% berechnet, gibt sie Hamburger mit 80%, Pollak nur mit 67% an. Die letzten größeren Arbeiten, die über diese Frage erschienen, sind die von Hahn aus der Magdeburger Säuglingsklinik und die von Pollak aus der Wiener Poliklinik.

Da nun seit Veröffentlichung der Pirquetschen Impfung in den Cölner Kinderkliniken jedes Kind bei Eintritt geimpft wurde, so fand ich ein reichhaltiges Material vor. Ich stellte dieses ziemlich nach gleichen Grundsätzen zusammen, wie Hahn, da dieser in seinen Tabellen fast alle gewichtigen Fragen beantwortet. Nur eine seiner Angaben, nämlich die, ob das Kind legitim oder illegitim ist, habe ich weggelassen, weil die Antwort auf diese Frage in vielen Krankengeschichten nicht gegeben ist, weil ferner bei der Cölner Industriebevölkerung auch viele legitime Kinder, deren Mutter arbeitet, in Pflege gegeben werden und sich in ihren äußeren Lebensbedingungen also wie illegitime Kinder verhalten. Dagegen habe ich in einer besonderen Spalte das Gewicht des Kindes an dem Tage angegeben, an welchem die Tuberkulose diagnostiziert wurde. Unmittelbar darunter habe ich in Prozenten angegeben, wie sich dieses Gewicht zu dem von Heubner angegebenen Durchschnittsgewicht der Kinder gleichen Alters verhält. Ich hielt dies deshalb für nötig, weil man sich aus dem Gewicht am leichtesten und raschesten ein Bild von dem Allgemeinzustand des Kindes machen kann.

Meine Fälle unterscheiden sich von denen Hahns vor allem dadurch, daß ich nur solche Fälle in meine Statistik aufnahm, bei denen die Diagnose innerhalb des

ersten Lebensjahres gestellt wurde. Selbstverständlich sind viele Fälle, bei denen die Kutanreaktion in den ersten Monaten des zweiten Lebensjahres positiv ausfiel, im ersten Jahre infiziert. Durch Ausschluß dieser Fälle ist mein Material natürlich erheblich ungünstiger geworden als das Hahns, da naturgemäß viele Fälle, die gegen Ende des ersten Lebensjahres infiziert, eine erheblich günstigere Prognose bieten, ausscheiden mußten. Weiter ist mein Material auch deshalb erheblich ungünstiger als das von Hahn, weil dieser bei seiner Statistik auch die Fürsorge heranzieht, während es sich bei mir mit wenigen Ausnahmen (Fall 2 und 44, welche aus der Poliklinik entnommen sind) um klinische Fälle handelt. Es sind also entweder Kinder, bei welchen die Tuberkulose schon solche Erscheinungen machte, daß die Eltern dadurch veranlaßt wurden, die Klinik aufzusuchen, und diese Fälle sind bekanntlich immer tödlich, oder um solche, welche außer ihrer latenten Tuberkulose noch eine andere Erkrankung, in der Mehrzahl der Fälle Ernährungsstörung hatten.

Von dem Material Pollaks unterscheidet sich das meinige vor allem auch dadurch, daß P. fast ausschließlich poliklinische Fälle aufführt, und ferner dadurch, daß P. vorwiegend solche Kinder pirquetisierte, bei denen er Verdacht auf Tuberkulose hatte. Darunter sind viele, die ohne Ernährungsstörung oder sonst sichtbaren Grund, bei richtiger und ausreichender Ernährung nicht zunahmen. Solche Fälle sind ja in der Poliklinik nicht selten, in die Klinik werden sie nicht aufgenommen, namentlich dann nicht, wenn sie an der Mutterbrust sind.

Infolge dessen müssen in meiner Statistik die geheilten Fälle in recht geringer Zahl vertreten sein, und man kann wohl sagen, daß ihr Prozentsatz in bezug auf Heilungsmöglichkeit Minimalzahlen darstellt.

Ich verweise auf die am Schluß der Arbeit folgende Tabelle. In Spalte I findet sich Name des Kindes und der Tag, an welchem die Diagnose auf Tuberkulose gestellt wurde. Spalte II enthält das Alter des Kindes am

betreffenden Tage, Spalte III die Art, wodurch die Diagnose sicher gestellt wurde, Spalte IV das Gewicht des Kindes, absolut und in Prozenten des Normalgewichtes, Spalte V die Ernährung des Kindes, ob Brust oder künstlich, Spalte VI die klinischen Symptome, Spalte VII den Ausgang der Erkrankung, Spalte VIII Sektionsbefund oder sonstige Bemerkungen und Spalte IX die Infektionsquelle.

Aus den Tabellen geht hervor, daß die Zahl der am Leben gebliebenen Fälle ziemlich klein ist, nämlich 8 unter 66 (in Prozenten 12,3) und von diesen ist einer nur wenig über 1 Jahr alt und noch sehr im Bereich des gefährdeten Alters. Bei 5 Fällen ließ sich der Ausgang nicht ermitteln. Ziehen wir diese Fälle ab, so beträgt der Prozentsatz der überlebenden 13,1 und wenn wir noch den gefährdeten Fall 50 abziehen, 11,4 Prozent.

Von den 6 Fällen, die im ersten Lebensquartal diagnostiziert wurden, blieb am Leben $1 = 16,3\%$

Von den 17 Fällen, die im zweiten Lebensquartal diagnostiziert wurden, blieben am

Leben (soweit Sicheres zu erfahren) $1 = 5,9\%$

im zweiten Jahr erst gestorben $1 = 5,9\%$

Das zweite Lebensjahr erreicht $2 = 11,8\%$

Von den 37 Fällen, die im zweiten Lebenshalbjahr diagnostiziert wurden, blieben

am Leben (soweit Sicheres zu erfahren) $6 = 16,2\%$

Dazu Fall 61, der sicher nicht an Tuber-

kulose starb $7 = 18,9\%$

Dazu noch 4 Fälle, die das vierte Lebens-

quartal erreichten $11 = 39,7\%$

Ein Fall, 61, wie schon erwähnt, ist sicher nicht an Tuberkulose gestorben. Das Kind kam von der chirurgischen Abteilung, wo es wegen einer Spina ventosa operiert worden war, mit allen Zeichen einer alimentären Intoxikation in unsere Klinik und starb am nächsten Tage.

Bei der Sektion fand sich außer der geheilten Spina ventosa als Zeichen der Tuberkulose nur Vergrößerung einiger Bronchialdrüsen, nirgends ein größerer Herd. Bei einem weiteren Fall ist es nach dem Sektionsbefund zum mindesten sehr zweifelhaft, ob die Tuberkulose die Todesursache war. Es fand sich nämlich bei der Sektion des Falles 54 nur eine ausgedehnte Bronchopneumonie nicht tuberkulöser Natur, ein kleiner subpleuraler Käseherd im 1. Oberlappen, verkäste Bronchial- und Hilusdrüsen, und nur wenige frische miliare Herdchen im linken Oberlappen. Nach Ansicht des Pathologen ist das Kind der Bronchopneumonie erlegen.

Um nun die überlebenden Fälle zu betrachten, soll in Folgendem kurz die Krankengeschichte jedes einzelnen exzerpiert werden.

Fall 2 (schon veröffentlicht bei Rohmer). Kind Müller, Johanna, geb. 20. 10. 08 kam zum erstenmal am 4. 11. 08 in die Mutterberatungsstelle. (Gewicht 4,150.) Die Mutter stillte das Kind, obwohl sie lungenkrank war und Blut hustete. Das Kind wurde zum erstenmal am 25. 11. 08 pirquetisiert und zeigte positive Reaktion. (36. Lebenstag. Gewicht 4,490, 108%). Bis zum 2. 8. 09 wurde das Kind in der Mutterberatung vorgestellt, wog damals 9,480. Bis Oktober 1909 war das Kind noch an der Brust. Mitte November und Mitte Dezember 1909 wegen kleinerer Erkrankungen in der Poliklinik. Im November wurde auch eine Röntgenaufnahme gemacht, auf der sich nichts Krankhaftes zeigte. Im Januar 1910 Masern, später noch Otitis media. Im Juli 1911 war Pirquet noch sehr stark positiv. Das Kind lebt jetzt noch und sieht blühend aus.

Fall 12: Konrad, Gretchen (schon veröffentlicht bei Rohmer), geb. am 4. 2. 09. Das Kind war am 28. 6. 09 in der Poliklinik vorgestellt worden wegen Ernährungsstörung und Husten. Damals Pirquet positiv. Nahrung nur 3 Wochen Brust, dann Milch-Wassermischung. Damals wog das Kind ca. 5000 g (79%). Es bestand eine In-

filtration des linken Oberlappens, die auch röntgenologisch festgestellt wurde. Am 5. Juli wurde das Kind in die Klinik aufgenommen, schon am 12. Juli wieder abgeholt. Am 7. September mit einem Gewicht von 6,200 g wegen Ernährungsstörung zur Poliklinik gebracht; außerdem bestand ein Skrophuloderma und eine Spina ventosa. Nach vorübergehender Besserung schwere Dekomposition. Am 13. 10. 09 Neuaufnahme in die Klinik, wo zunächst das Gewicht bis auf 4,760 g sank, um allmählich wieder anzusteigen. Nach Abheilung der Ernährungsstörung am 23. Dezember 1909 in die chirurgische Klinik verlegt. Gewicht 5,410. Dort wurden eine Reihe von Knochenherden entfernt. Später erholte sich das Kind unter Freiluftbehandlung gut, und wurde im September 1912 geheilt entlassen.

Fall 30: Eich, Willi, geb. 19. 8. 1908, kam am 15. 6. 1909 in die Klinik wegen leichter Ernährungsstörung. Gewicht 8080 g, 85%, hatte bis dahin immer Brust erhalten. Es fand sich positiver Pirquet, sonst kein Zeichen von Tuberkulose, auch auf dem Röntgenbilde nicht. Am 27. 6. 09 wurde das Kind auf Wunsch der Eltern entlassen. Am 15. 2. 10 Neuaufnahme. Es bestand damals eine Infiltration der rechten Lunge, die auch auf dem Röntgenbild sichtbar war. Am 20. 2. waren diese Erscheinungen geschwunden und das Kind wurde entlassen. Am 19. 6. 11 wegen Bandwurm wieder in die Klinik, Pirquet positiv. Auf dem Röntgenbild zeigten sich peribronchiale Verdichtungen und auch in der rechten Lunge einige matt angedeutete Fleckchen, die aber keine sichere Deutung zuließen. Am 18. 6. wurde das Kind, damals 2 Jahre und 11 Monate alt, entlassen. Seitdem war nichts mehr von ihm zu erfahren.

Fall 37: Heinen, Nette, geb. 8. 2. 11 kam am 30. 12. 11 in der Klinik wegen Erbrechen, Fieber, Husten. Das Kind war 4 Monate an der Brust gewesen, dann künstlich ernährt worden. 3 Monate vor der Aufnahme hatte das Kind Masern überstanden. Es fand sich eine krupöse Pneumonie, das Fieber fiel in 2 Tagen zur Norm

ab. Am 3. 1. 12 Pirquet positiv. Gewicht 6550 (70%). Am 7. 1. 12 entlassen. Nach freundlicher Mitteilung des Städtischen Waisenamtes lebt das Kind jetzt (November 1912) noch (21 Monate alt). Genaueres war nicht zu erfahren.

Fall 44: Malzmüller, Anna (schon erwähnt bei Bungart unter Nr. 13), geb. am 4. 4. 10, kam am 27. 10. 10 wegen Husten in die Poliklinik. Es fand sich positiver Pirquet, Lungen waren frei, Schwellung der Axillardrüsen. Das Kind wurde nur noch wenige Male vorgestellt und blieb dann außer Beobachtung. Später kam es wegen Spina ventosa in die chirurgische Klinik und wurde dort mit Tuberkulin behandelt. Am 24. 7. 11 Aufnahme in die Kinderklinik wegen akuter Ernährungsstörung. Gewicht 7360 g, Pirquet positiv. Damals bestanden Narben von Hauttuberkuliden und eine ausgeheilte Spina ventosa. Am 13. März 1912 neuerdings in der Poliklinik wegen Urticaria vorgestellt. Pirquet war damals nur schwach positiv, später noch mehrmals in der Poliklinik wegen chronischer Rhinitis. Zuletzt wurde das Kind auf Aufforderung, am 9. 11. 1912, 2½ Jahre alt und in gutem Allgemeinzustand vorgestellt. Pirquet war an diesem Tage wieder stark positiv. Gewicht 11750 g.

Fall 50: Niedecken, Oskar, geb. 14. 9. 11, nur 10 Tage an der Brust, dann mit Backhausmilch ernährt. War wegen Ernährungsstörung am 22. 4. 1912 in die Klinik gekommen. Gewicht 5,940, 74%. Es fand sich damals eine Bronchitis. Röntgenologisch zeigten sich starke Bronchialdrüsenschatten, auch war der rechte Oberlappen weniger durchleuchtet als der linke. Das Kind wurde nach wenigen Tagen aus der Klinik genommen. Am 11. 5. 12 Neuaufnahme wegen Husten. Objektiv nichts nachzuweisen. Das Gewicht nahm während des Klinikaufenthaltes von 6100 bis 5600 ab bei guten Stühlen. Am 27. 6. 1912 aus der Klinik geholt, wurde es am 12. 11. 12 auf Aufforderung wieder vorgestellt. Es ist jetzt 14 Monate alt, wiegt 7130 g, be-

ginnt zu laufen. Auf der Lunge befindet sich rechts über der Scapula eine schwache Dämpfung und verschärftes Atmen mit feuchtem, großblasigem Rasseln. Pirquet sehr stark, Blasenbildung. Da dieser Fall noch in sehr gefährdetem Alter ist, und nachweisbare Lungenerscheinungen hat, so ist die Aussicht, denselben am Leben zu erhalten, recht gering.

Fall 63: Zaun, Heinrich, geb. im Juli 1909, hatte 4 Monate Brust, dann Milchschleimmischungen erhalten. Kam am 6. Mai wegen Erbrechens und Durchfalls in die Klinik. Gewicht 6000 g, 65%. Es wurde damals ausdrücklich auf die schlaffe Muskulatur des Kindes hingewiesen, Pirquet war positiv. Über dem linken Unterlappen fand sich leicht tympanitischer und verkürzter Schall, leises Bronchialatmen. Das Gewicht nahm rasch zu und das Kind wurde am 11. Sept. mit 7200 g entlassen. Am 1. 2. 1911 kam es wegen Urticaria in die Poliklinik, am 3. 4. 11 neuerdings poliklinische Behandlung wegen Bronchopneumonie. Am 5. April Pirquet positiv. Kam dann wegen verschiedener kleinerer Leiden öfters in die Poliklinik, zuletzt am 10. Dez. 1911 im Alter von 2 Jahren und 5 Monaten. Seitdem war nichts mehr zu erfahren. Ausdrücklich ist mehrmals im poliklinischen Krankenblatt darauf hingewiesen, daß das Kind vernachlässigt aussieht.

Fall 65: Zimmermann, Heinrich, geb. 20. 12. 1910. Hatte 4 Monate Brust erhalten, dann Mehlschleimmischungen. Kam am 17. 7. 1911 wegen Ernährungsstörung in die Klinik. Pirquet stark positiv, Gewicht 5600 g, 70%, erholte sich nur langsam und wog bei der Entlassung am 15. Oktober 1911 nur 5650 g. Klinische Zeichen von Tuberkulose hatte es nicht geboten. Auf briefliche Aufforderung am 8. 11. 1912 wieder vorgestellt. Es ist jetzt 22½ Monate alt, sieht gut aus, läuft, hat Masern und Lungenentzündung überstanden. Gewicht 10 140 g.

Wenn wir diese lebenden Fälle betrachten, so finden wir manches Gemeinsame. Es handelt sich bei Fall 2

und Fall 30 um Brustkinder, bei Fall 37, 63, 65 um Teilbrustkinder, 3 Fälle waren ausschließlich künstlich genährt. (Fall 12, 44, 50). Auf diese größere Widerstandskraft der Brustkinder und Teilbrustkinder ist schon von anderer Seite (Engel, Sehlbach, Hahn) hingewiesen worden.

Ein weiteres gemeinsames Moment findet sich noch, das meines Wissens bisher noch nicht so betont worden ist, wie es seiner Bedeutung entspricht, nämlich das relativ gute Gewicht der Kinder. Keiner der Fälle, welche überlebten, zeigte bei Feststellung der Diagnose ein geringeres Gewicht als 65% des normalen. Allerdings wurde das Normalgewicht nur von einem einzigen erreicht, respektive überschritten. Von den Verstorbenen zeigten nur 20 ein relatives Gewicht von 65% und mehr und auch nur einer erreichte, resp. überschritt das normale Gewicht.

Diese Tatsache gibt uns einen Fingerzeig, um wieviel besser die Statistik der Säuglingstuberkulose an klinisch gesundem Material geworden wäre. Die überwiegende Mehrzahl der Kinder ist durch Ernährungsstörungen im Gewicht so heruntergekommen gewesen, daß sie gegenüber der Tuberkulose nicht mehr die nötige Widerstandskraft aufbringen konnten. Wir können das ziemlich sicher behaupten, denn die Säuglingstuberkulose als solche ist keine konsumierende Krankheit, eine Tatsache, auf welche schon Engel hingewiesen hat.

Wenn wir uns nun den Gestorbenen zuwenden, so ist die Dauer der Erkrankung von einem gewissen Interesse.

Sehlbach hat nämlich darauf hingewiesen, daß, wenn man die Säuglingsleichen nach dem Alter einteilt, im 5. und 6. Monat und zu Beginn des zweiten Lebensjahres der Prozentsatz der Tuberkulosen ansteigt, und hat daraus Schlüsse gezogen auf die Zeit, in der die Tuberkulose erworben wurde. Er ging dabei von der Ansicht aus, daß eine Säuglingstuberkulose im allgemeinen binnen 3 Monaten zum Tode führe und rechnete einfach um diese

Zeit zurück, um so den Zeitpunkt der Infektion festzustellen.

Gegen diese Auffassung hat schon Ostermann Front gemacht, indem er darauf hinwies, daß das Material Sehlbachs viel zu klein ist, um so weitgehende Beschlüsse zu gestatten, wie dieser sie zieht. Auch fand Ostermann, daß die Theorie, wonach die Frist zwischen Infektion und Tod bei der Säuglingstuberkulose durchschnittlich 3 Monate betrage, völlig unhaltbar sei.

Diese Ansicht Ostermanns wird auch durch mein Material bestätigt. Die Dauer der Erkrankung vom Tag der Diagnose bis zum Todestag betrug:

weniger als 8 Tage bei	17 Fällen
8 Tage bis 1 Monat bei	13 Fällen
1 bis 2 Monate bei	8 Fällen
2 „ 3 „ „	5 Fällen
3 „ 4 „ „	4 Fällen
4 „ 6 „ „	1 Fall
6 „ 9 „ „	3 Fällen
9 „ 12 „ „	1 Fall
12 „ 18 „ „	1 Fall

Von den Kindern, deren Schicksal unbekannt ist, lebte eines länger als 10 Monate, eines länger als 18 Tage, eins länger als 1 Monat 4 Tage, eins länger als 2 Monate 4 Tage, eins länger als 1 Monat. Wohl gemerkt handelt es sich dabei um die Zeit zwischen Stellung der Diagnose und Tod. Selbstverständlich ist der Tag, an dem die Diagnose gestellt wurde, viel später als der Tag der Infektion. Wenn nun von den 58 Fällen 24 zwei Monate und länger am Leben waren, so ist das ein sicherer Beweis, daß die Säuglingstuberkulose nicht nur häufig, sondern sogar in der Regel länger dauert als 3 Monate, umsomehr als wir die 17 Fälle, die in den ersten 8 Tagen starben, vollständig bei Beurteilung dieser Frage ausscheiden müssen, denn bei diesen handelt es sich sicher um die Endstadien lange vorher erworbener Infektionen.

Die Ansicht Morgenroths, daß die durchschnittliche Dauer der Erkrankung 6 Monate betrage, scheint richtiger zu sein. Aber bei einer Erkrankung, die, wie die Tuberkulose so verschiedenartigen Verlauf zeigt, hat die Berechnung der Durchschnittsdauer keinen praktischen Wert.

Sicher hätten wir noch eine viel längere Dauer der Erkrankung gefunden, wenn wir die Kinder viel früher, in gesunden Tagen, hätten pirquetisieren können. Denn daß in einem durch Ernährungsstörung geschwächten Organismus die Tuberkulose rascher fortschreitet, daß andererseits bei bestehender Ernährungsstörung der Tod auch eintritt, wenn die Tuberkulose noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie ohne diese Komplikation, ist selbstverständlich. Bei einigen Fällen läßt sich auch die Infektion begrenzen.

Bei Fall 4 beträgt die längstmögliche Dauer der Erkrankung 4 Monate 19 Tage, die kürzestmögliche 3 Monate 14 Tage.

Bei Fall 20 ist die Infektion wahrscheinlich kurz vor Eintritt erfolgt, da am Tage des Eintritts (8. 3. 09) die Pirquetsche Reaktion negativ war. Am 3. 5. 09 war sie positiv. Ein sicherer Beweis ist das natürlich nicht, da bei der einmaligen Impfung auch ein Zufall mitgespielt haben kann. Immerhin wäre das sehr auffallend, und so ist der Schluß ziemlich berechtigt, daß eben zu jener Zeit die Tuberkulose noch ganz in ihrem Anfangsstadium war. In der Zwischenzeit zwischen beiden Impfungen war das Kind nicht mit Tuberkulösen zusammengekommen. Der Tod erfolgte 4 Monate 23 Tage nach dem Eintritt.

Bei Fall 22 liegen die Verhältnisse ähnlich. Auch hier Pirquet bei Eintritt negativ, 15 Tage darauf positiv. Der Tod erfolgte 3 Monate 10 Tage nach Eintritt.

Bei Fall 33 war die Infektion in den ersten 5 Lebensmonaten erfolgt. Das Kind starb mit 13 Monaten 4 Tagen. Dauer der Erkrankung also mindestens 8 Monate.

Bei Fall 34 war der tuberkulöse Vater bis Mai 1908

im Hause. Pirquet war positiv am 19. 8. 08, entlassen wurde das Kind am 23. 10. 08, lebte also noch mindestens 5 Monate nach erfolgter Infektion.

Bei Fall 54, der zuerst poliklinisch behandelt worden war, wurde am 15. Juli 1912 Pirquet gemacht, weil die Pflegefrau berichtete, daß der Vater des Kindes an Tuberkulose gestorben sei. Das Kind war am 1. Juli in Pflege gekommen und in der Zwischenzeit nicht bei seinem Vater gewesen. Die Infektion muß also vor diesem Datum erfolgt sein. Da das Kind am 8. Nov. 1912 starb, ist die Mindestdauer der Erkrankung 4 Monate und 8 Tage.

Wenn wir nun in einem konkreten Fall von Säuglingstuberkulose die Prognose stellen sollen, welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?

Erstens steht fest, daß je später ein Kind infiziert wird, um so größer die Wahrscheinlichkeit ist, daß es die Tuberkulose übersteht. Allerdings wird es in sehr vielen Fällen ganz unmöglich sein, den Zeitpunkt der erfolgten Infektion festzustellen. Wir können nur sagen, daß die Infektion vor der Zeit stattgefunden hat, zu welcher wir die Diagnose stellen, und können nur dann Schlüsse auf eine sehr früh erfolgte Infektion ziehen, wenn es gelingt, die Diagnose ebenfalls in noch sehr jugendlichem Alter zu stellen.

Weiter ist von großer Bedeutung die Ernährung des Kindes. Es zeigt sich allgemein, daß Brustkinder und Teilbrustkinder mehr Aussicht haben, am Leben zu bleiben. Doch ist auch bei künstlicher Ernährung die Prognose nicht ganz infaust.

Am Leben blieben:

	Brust- kinder	Teilbrust- kinder	künstl. Genährte	
	2	3	3	= 8
	25%	37,5%	37,5%	d. Geheilten
Gestorben sind:	4	12	32	= 48
	8,33%	25%	66,67%	d. Gestorbenen

(Von 5 Kindern war die Ernährung nicht festzustellen.)

Mortalität der tuberkulösen Brustkinder	= 67%
„ der tuberkulösen Teilbrustkinder	= 75%
„ der tuberkulösen, künstlich genährten Kinder	= 91%

In engem Zusammenhang damit steht der dritte Punkt: das Gewicht des Kindes zur Zeit der Diagnosenstellung. Wie sich bei meinem Material zeigt, waren alle Kinder, deren Gewicht zur Zeit der Diagnosenstellung weniger als 65% des Normalgewichtes betrug, mit anderen Worten, die weniger als $\frac{2}{3}$ des Normalgewichtes hatten, verloren. Natürlich haben die Heubnerschen Normalzahlen nicht unbedingte Geltung, und man wird z. B. bei sehr jungen Kindern auch das Geburtsgewicht erheblich in Rechnung ziehen müssen, aber mit diesen Einschränkungen kann man die obige Regel wohl gelten lassen. Daß die Tuberkulose bei gut genährten Säuglingen günstiger verlaufen kann, ist von Engel 1906 auch am Sektionstisch nachgewiesen worden (Monatschrift für Kinderheilkunde 1908). Er stellt nämlich fest: „Die gut genährten Säuglinge, vorwiegend Brustkinder, zeichnen sich samt und sonders dadurch aus, daß die Tuberkulose im wesentlichen bei ihnen in den Drüsen lokalisiert ist, und daß am Schluß ein katastrophaler bazillärer Einbruch, meist eine akute miliare Aussaat zum Ende geführt hat. Die elenden abgemagerten Kinder hingegen, deren jammerbares Aussehen schon bei Beginn der Behandlung den Verdacht auf eine schwere organische Erkrankung hinlenkte, hatten alle chronische Organtuberkulose verschiedenster Art, chronische konfluierende Miliartuberkel, Peritonitis caseosa usw.“ Wir sehen also daraus, daß es bei den gut genährten Säuglingen gewissermaßen eines unglücklichen Zufalls bedarf, um die bis dahin lokalisierte Tuberkulose zu einer tödlichen Krankheit werden zu lassen. Das können verschiedene Infektionskrankheiten, Masern oder Keuchhusten sein. In anderen Fällen aber kommt es, ohne daß eine besondere äußere Ursache gegeben ist, beim langsamen Weiter

Schreiten des Prozesses zur Zerstörung einer Blutgefäßwand, damit zur Verschleppung in die Blutbahn und zur miliaren Aussaat.

Verschiedene Autoren führen als weiteren Faktor bei der Prognose der Säuglingstuberkulose noch den Umstand an, ob das einmal infizierte Kind noch weiteren Infektionen, Superinfektionen, ausgesetzt ist. Von anderen, insbesondere von Römer wird das bestritten. Meine überlebenden Fälle scheinen letzteren Recht zu geben, so war Fall 2 immer bei seiner tuberkulösen Mutter, Fall 30 ebenfalls, der Vater des Kindes Fall 65 ist erst im Oktober 1912 gestorben und bis dahin war das Kind in seiner Gesellschaft.

Gerade diese letzte Frage ist praktisch von großer Bedeutung. Nachdem festgestellt ist, welcher ungeheuren Wert gerade für das tuberkulöse oder durch Tuberkulose gefährdete Kind die natürliche Ernährung hat, taucht oft die Frage auf: Soll die tuberkulöse Mutter ihr Kind stillen, natürlich, wenn es ihr eigener Zustand erlaubt? Darauf wird sich die Antwort je nach den Verhältnissen verschieden gestalten. In glänzenden äußeren Verhältnissen, wo eine völlige Trennung zwischen Mutter und Kind möglich ist, wird man diese vornehmen, wird dem Kind möglichst eine Amme geben. In weniger glänzenden Verhältnissen wird man vielleicht, meist durch Kutanempfung feststellen, ob das Kind schon infiziert ist. Wenn ja, wird man das Kind an der Brust der Mutter lassen, wenn nicht, kann man auf Trennung dringen. In kleinen Verhältnissen dagegen, wo die Mutter auf alle Fälle die Pflege des Kindes übernehmen muß, da wird man immer darauf sehen, daß das Kind möglichst lange natürlich, wenn die Mutter das vermag, genährt wird. Die Infektion läßt sich hier doch kaum vermeiden, und wenn diese erfolgt ist, dann hat das Brustkind ja viel höhere Heilungsaussichten. Selbstverständlich wird man der Mutter entsprechende Verhaltensmaßregeln geben, um

das Kind, falls es noch nicht infiziert ist, möglichst vor Infektion zu bewahren.

Daß das recht wohl möglich ist, beweist ein Fall, den ich in der Säuglingsfürsorge beobachten konnte. Probst, Hans, geb. 9. 7. 1911. Mutter leidet an offener Tuberkulose, ist durch die städtische Tuberkulosefürsorge über die zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln informiert. Die städtische Säuglingspflegerin, die das Kind öfters besuchte, berichtete mir jedesmal, daß in der Wohnung peinliche Sauberkeit herrsche. Das Kind war nur 1 Monat ausschließlich an der Brust, dann bis zum 5. Monat im Allaitement mixte, von da an künstlich genährt. Ist jetzt kräftig und gesund. Pirquet mehrmals, zuletzt am 8. 11. 1912 (17 Monate alt) immer negativ.

Pollak macht noch auf einen weiteren Punkt aufmerksam, der bei Stellung der Prognose zu berücksichtigen sei, die Schwere der Erkrankung des Phthisikers, der das Kind infiziert hat. Ich war nicht imstande, hier Nachuntersuchungen anzustellen, aber eine meiner Beobachtungen scheint Pollak Recht zu geben: Die tuberkulöse Mutter des Kindes Müller (Fall 2), das schon mit 36 Tagen positiven Pirquet hatte, hat dieses Kind 11 Monate gestillt, hat zwei Jahre später wieder geboren, auch dieses Kind lange gestillt und befindet sich jetzt noch relativ wohl, gewiß ein Zeichen, daß die Erkrankung bei ihr leicht ist.

Das einzig Positive also, was wir in der Bekämpfung der Säuglingstuberkulose tun können, ist, für richtige Ernährung und gute hygienische Verhältnisse zu sorgen.

Es mag dadurch gelingen, der Säuglingstuberkulose die Form zu geben, wie sie die Tuberkulose älterer Kinder, etwa 2—4jähriger hat. Daß das möglich ist, scheinen folgende Fälle zu beweisen, in welchen der tödliche Ausgang nur einer interkurrenten Krankheit zuzuschreiben ist, die aber eigentlich den in obigem Sinn

geheilten Säuglingstuberkulosen zugerechnet werden können.

Fall 18: Reimer, Anna, geb. 13. 7. 08. Pirquet positiv. Am 31. 12. 08 in der Poliklinik. An der Brust ernährt, Gewicht 5570 (83%). Objektive Erscheinungen der Lungenerkrankung fanden sich damals nicht. Das Kind wurde im Februar 1909 (7 Monate) gestillt. Am 10. März 1909 wurde das Kind in die Klinik aufgenommen und zwar wegen eines Reizhustens und einiger vergrößerter Drüsen im Halse. Außerdem bestanden noch über beiden Lungen trockene bronchitische Geräusche, aber keine Zeichen einer Infiltration. Das Kind erhielt in nächster Zeit tuberkulininjektionen, doch mußten diese wieder abgebrochen werden, da auf jede Injektion starke Blutung und Abszeßbildung folgte. Gewicht nahm nur wenig zu, Temperaturkurve war unregelmäßig, der Husten dauerte an. Im Juni fanden sich auf dem Röntgenbild nur einige Drüsenschatten im Hilus, Ende Juli eine pneumonische Verdichtung des linken Oberlappens, die jedoch im August wieder verschwunden war. Am 12. August wurde das Kind entlassen. Gewicht 5000. Am 31. August Neuaufnahme wegen einer akuten Ernährungsstörung. Auf der Lunge nichts mehr zu finden. Auch der Husten bestand nicht mehr. Röntgenologisch am 24. Okt. Vollständig normaler Lungenbefund, im rechten Hilus ein schwacher Schatten, der aber keine sichere Diagnose zuließ. Die Hautreaktion war am 11. und 15. Oktober schwach positiv gewesen, am 20. vollständig negativ. Am 4. November wurde das Kind in gutem Allgemeinzustand mit dem Gewicht von 6100 g wegen Skabies in die Hautklinik verlegt. Am 8. November mit einer akuten Ernährungsstörung zurückverlegt. Trotzdem diese sich bald besserte, das Gewicht, das vom 4. bis 8. November um 550 g gesunken war, rasch wieder den alten Stand erreichte, blieben nunmehr die Temperaturen ganz regelmäßig und vom 19. Nov. an nimmt das Gewicht ständig ab. Am 20. Nov. Pirquet wieder positiv, rapider

Gewichtssturz. Am 29. Nov. zeigen sich die ersten Symptome einer tuberkulösen Meningitis, am 13. Dez. Exitus (17 Monate alt).

Sektion: Tuberkulöse Meningitis. Solitärtuberkel im Hirn, verkäste Bronchial- und Mesenterialdrüsen. Links seitige pleuritische Adhäsion. Am oberen Rande des linken Unterlappens befindet sich ein Herd, in welchem das Lungenparenchym von Bindegewebsherden durchsetzt ist, in denen man klaffende Bronchien sieht, dazwischen finden sich auch kleinste Knötchen. Mikroskopische Untersuchung ergibt, daß hier tuberkulöser Herd, in Heilung begriffen, vorlag.

Es handelte sich also um einen Fall, welcher, dem äußeren Anschein nach, die denkbar günstigste Prognose bot; in der Tat zeigte sich ja auch, daß die klinischen Erscheinungen zurückgingen, ein Befund, der durch die bei der Sektion aufgedeckten Heilungsvorgänge sicher bestätigt wurde. Eine akute Ernährungsstörung führt zu einer plötzlichen Aussaat in die Meningen und das Hirn. Der Verlauf ist also ganz der wie bei älteren Kindern.

Von allen Infektionen hat wohl die mit Masern bei derartigen Kindern die verderblichste Wirkung, eine längst bekannte Tatsache, die auch durch mein Material bestätigt wird.

Fall 28: Dunkel, Hermann, geb. 2. 12. 1910, 5 Wochen an der Brust, dann künstlich ernährt. Kam am 11. 8. 11 wegen schwerer Ernährungsstörung und Bronchopneumonie des rechten und linken Unterlappens in die Klinik, Pirquet positiv, Gewicht 5220 (59%). Das Fieber und die Lungenerscheinungen gingen in wenigen Tagen zurück, das Gewicht nahm rasch zu und am 24. 9. wurde das Kind in gutem Zustand mit einem Gewicht von 5900 g entlassen. Es bestand nur noch eine Keratitis phlyctenulosa. 13½ Monate später wurde das Kind wieder in die Klinik gebracht, am 3. 10. 1912. Gewicht 6700 g. Das Kind hatte 2 Monate vorher Masern durchgemacht, seitdem kränkelte es und magerte stark ab. Es fand sich

Otitis media rechts, Lymphdrüenschwellung am Hals, über der ganzen rechten Lunge Dämpfung, pleuritisches Reiben, Atmung mit bronchialem Beiklang. Röntgenbild zeigte auf der rechten Lunge vom angulus scapulae nach abwärts einen scharfen Schatten, dabei stark wechselnde Temperaturen zwischen 39 und 37°. Unter ständigem Verfall am 22. 10. 1912 Exitus.

Sektion: Tuberkulose der Bronchialdrüsen, Empyem rechts, Tuberkulose der rechten Lunge mit Kaverne. Tuberkulose der linken Lunge. Miliartuberkulose der Milz und Nieren.

Wir finden also eine Tuberkulose, welche stationär geblieben war. Im Anschluß an eine Maserninfektion kommt es in diesem Fall nicht, wie meistens, zu einer allgemeinen Miliartuberkulose, sondern zu einem Aufflammen des Prozesses, der nunmehr im Verlauf von 3 Monaten zum Tode führt.

Fall 35: Haas, Wilhelm, geb. 12. 11. 08. 6 Monate an der Brust ernährt. Eingetreten am 24. 8. 09 wegen Ernährungsstörung, Pirquet positiv, Gewicht am Eintrittstage 5830 (66%). Das Kind erhielt nun in den nächsten 2 Monaten steigende Tuberkulindosen. Da aber die Temperaturen infolge von Schnupfen und Entzündungen des Nasenrachenraumes sowie Otitis immer unruhig waren und somit die Beurteilung der Reaktion auf das Tuberkulin erschwerten, wurde die Kur abgebrochen. Mehrmals traten auch Bronchopneumonien auf, doch gedieh das Kind im ganzen recht gut, das Gewicht stieg bis Ende März 1910 auf 8200. Im April trat eine pneumonische Infiltration der linken Lunge ein, die sich nicht wieder zurückbildete, obwohl das Fieber schon nach 3 Tagen wieder sank. Am 24. April neuerdings Fieber, am 28. Koplik, am 29. Masernexanthem, am 2. Mai ging das Fieber noch einmal herunter, stieg aber wieder an und blieb bis zum Tode des Kindes. Außerdem bestand fortwährend starke Bronchitis und Schnupfen. Auch die vorerwähnte Infiltration der linken Lunge blieb unverändert.

Am 22. Mai plötzlicher Kollaps und binnen weniger Minuten Exitus (18 Monate alt).

Sektion: Dilatation und Hypertrophie des Herzens, entzündete adenoide Vegetationen ohne tuberkulöse Herde. Eine größere Anzahl tuberkulöser, teilweise erweichter Tracheal- und Bronchialdrüsen links, wenige mit kleinen Käseherden rechts. Starke Bronchitis. Linke Lunge in ihrer ganzen Ausdehnung derb infiltriert und mit frischen Miliarknötchen durchsetzt. Nur wenige von diesen zeigen Verkäsung.

Wir haben also ein Kind, welches trotz bestehender tuberkulöser Infektion und trotz der Erscheinungen des Lymphatismus sich gut entwickelt. Wie auch die Sektion gezeigt hat, war die Tuberkulose entsprechend dem Typus des älteren Kindes auf die Lymphdrüsen beschränkt geblieben. Erst im Anschluß an eine Maserninfektion kommt es zur miliaren Ausbreitung. Daß tatsächlich diese Ausbreitung erst nach der Maserninfektion erfolgte und nicht schon die Pneumonie im April diesen Zeitpunkt bedeutete, geht mit Sicherheit daraus hervor, daß die Herdchen noch ganz jung waren.

Fall 62: Weiser, Peter, geb. 23. 3. 09. Über Ernährung des Kindes nichts Genaues bekannt, doch kann es nicht lange an der Brust gewesen sein, da die Mutter einige Monate nach der Geburt wegen Nephritis im Krankenhaus gewesen war. Kam 24. 1. 1910 wegen Kinderlähmung, die im Anschluß an eine vor 2½ Monaten bestandene fieberhafte Erkrankung (Poliomyelitis anterior) entstanden war, in die Klinik. Pirquet positiv. Gewicht 7420 (81%). Für Tuberkulose kein klinischer Befund. Am 8. 2. in gutem Zustand auf Wunsch der Mutter wieder entlassen. Am 15. 11. 1910 (1 Jahr 8 Monate alt) neuerdings aufgenommen. Das Kind hatte 10 Tage vorher Masern durchgemacht und bot nun ein schwerkrankes Bild dar. Es bestand auf der Lunge, rechts hinten oben tympanitischer Perkussionsschall, vom angulus scapulae abwärts Dämpfung. Über

der rechten Spitze scharfes Atmen mit dichtem kleinblasigen Rasseln, in den gedämpften Partien Bronchialatmen mit grobem Rasseln. Links nur vereinzeltes Schnurren und Rasseln. Milz etwa $\frac{1}{2}$ cm unter dem Rippenbogen zu fühlen, außerdem rechts vom After ein periproktitischer Abszeß, der am nächsten Tag inzidiert wurde. Unter beständigem Fieber wechselten die Lungenerscheinungen an Intensität und Ausbreitung, aber eine wesentliche Änderung trat nicht ein, dabei mußte beständig mit Koffein und Digalen eingegriffen werden. Der Abszeß, der sich schon gereinigt hatte, fing von neuem an zu sezernieren. In diesem Zustand wurde das Kind am 27. 11. von seiner Mutter abgeholt. Über sein Schicksal war nichts weiter mehr zu erfahren, doch ist es wohl sicher bald darauf gestorben.

Es handelt sich also um ein Kind, bei dem im 10. Monat sich positiver Pirquet vorfand, ohne irgend welche klinische Erscheinungen von Tuberkulose. Auch der Gewichtszustand war ein sehr günstiger. Das Kind lebte auch tatsächlich bis zum 20. Monat, einem Alter, in welchem erfahrungsgemäß die Aussichten auf Heilung der Tuberkulose bedeutend bessere geworden sind. In diesem Alter akquiriert das Kind eine Maserninfektion und verfällt nun rapid.

Nachdem, wie wir gesehen haben, die Säuglingstuberkulose der ärztlichen Therapie soviel wie gar keinen Spielraum gewährt, müssen wir bei der Prophylaxe einsetzen, d. h. wir müssen der Infektion den Weg zum Säugling verlegen. Dazu ist nun unbedingt notwendig, daß wir diese Wege kennen.

In der Zeit kurz nach der Kochschen Entdeckung nahm man an, daß der Tuberkelbazillus ubiquitär sei. Die Untersuchungen von Cornet u. a. haben ergeben, daß das nicht der Fall ist, daß im Gegenteil das Vorkommen der Tuberkelbazillen nur in begrenzter Umgebung des Schwindsüchtigen nachzuweisen ist. So konnte Cornet nur in einer Entfernung von etwa 1 m vom Bette des

kranken Patienten in der Luft Tuberkelbazillen nachweisen, auch Ostermann fand nur in sehr mäßigem Umfange im Bodengstaub der Wohnung Tuberkulöser Tuberkelbazillen.

Eine andere Möglichkeit der Tuberkulosenentstehung glaubte Baumgarten in hereditärer Tuberkulose gefunden zu haben, doch konnten seine Ansichten experimentell nicht bestätigt werden.

Großes Aufsehen erregte seiner-Zeit der Ausspruch Behrings, daß jede Tuberkulose im Kindesalter erworben sei und unter Umständen lange latent bleibe. Als Hauptweg der Infektion nahm Behring den intestinalen an. Er nahm an, daß das Kind mit der Milch Tuberkelbazillen verschluckte, daß diese die Darmwand, unverändert und ohne Spuren zu hinterlassen, passieren, und nun jahrelang im Körper latent bleiben, bis sie durch eine äußere Ursache wieder virulent werden und Tuberkulose hervorrufen. Vor allem glaubte Behring, die Milch tuberkulöser Kühe anschuldigen zu müssen. Dagegen wurde geltend gemacht, daß bei uns höchst selten Kindern ungekochte Milch verabreicht würde (hier in Cöln herrscht eher die Unsitte, die Milch zu lange als gar nicht oder zu kurze Zeit zu kochen, was ich daraus entnehme, daß in unserem Säuglingsmateriale die Barlowsche Krankheit durchaus nichts Seltenes ist). Weiter wurde berichtet, daß in Japan und anderen Ländern, in denen Kuhmilch überhaupt nicht genossen wird, die Tuberkulose ebenso ihre Opfer fordere wie bei uns. Behring ließ denn auch die Hypothese von der Infektion durch Milch von tuberkulösen Kühen mehr oder weniger fallen, umsomehr als Koch auf dem Tuberkulosekongreß in London die Ansicht vertreten hatte, daß der Erreger der menschlichen und bovinen Tuberkulose nicht völlig sei und als durch zahlreiche Untersuchungen (Kossel, Weber, Heuß, zitiert bei Weber in Kolle-Wassermanns Handbuch) diese Hypothese bestätigt wurde. Dagegen hielt Behring an der Idee der Fütterungstuberkulose fest. Zahlreiche Tier-

versuche schienen ihm Recht zu geben; es gelang tatsächlich nachzuweisen, daß bei sehr jugendlichen Organismen die Bazillen die Darmwand passieren, ohne Veränderungen zu hinterlassen.

Doch zeigte sich, daß zur Infektion so große Bakterienmengen nötig wären, wie sie praktisch für die Infektion des Menschen niemals in Betracht kommen. Weiter zeigte sich, daß auch das Verbringen der Bakterien in den Intestinalkanal es nicht unmöglich macht, daß dieselben retrograd nach der Rachen- und Mundhöhle transportiert und hier auf dem Luftwege in die Lungen gebracht wurden. (Findel, Laffert, Pfeiffer, Friedberger, Uffenheimer, zitiert bei Kolle-Hetsch.)

Ziemlich allgemein anerkannt wurde nur die eine Behauptung Behrings, daß der Grund zu den meisten menschlichen Tuberkulosen im Kindesalter gelegt wurde, nicht, wie Behring zuerst sagte, im Säuglingsalter.

Schon Ibrahim forderte 1905 als Beweis für Behrings Theorien:

„Untersuchungen größerer Reihen von Säuglingen mit Tuberkulinreaktion müßten ergeben:

1. daß eine ganze Reihe scheinbar gesunder Säuglinge reagieren,

2. daß die Reagierenden zum großen Teil ohne erhebliche Schädigung über die Kindheit hinauskommen, um dann der Schwindsucht zum Opfer zu fallen.“

Durch Pirquets Entdeckung sind solche Untersuchungen möglich geworden, und setzt man in die Sätze Ibrahims statt „Säuglinge“ „Kinder“ ein, so sind seine Forderungen erfüllt.

Ebenso allgemein anerkannt ist der Satz Cornets, daß die bei weitem häufigste Infektionsquelle der tuberkulöse Mensch ist.

Auch bei meinen Fällen war es in der weitaus überwiegenden Anzahl, nämlich in 45 von 66 Fällen (d. i. in 68,2% aller Fälle) möglich, die Infektionsquelle nachzuweisen. Unter die unaufgeklärten Fälle rechne ich auch

die beiden (18 und 50), wo der illegitime Vater des Kindes tuberkulös war, und das Kind nie mit ihm zusammen gekommen war. Denn die Möglichkeit der germinativen Übertragung vom Vater auf das Kind ist, wie Gärtner nachgewiesen hat, so verschwindend gering, daß sie praktisch nicht in Betracht kommt. Dazu kommt noch, daß beide Fälle noch lange Zeit am Leben blieben, resp. noch am Leben sind (Fall 18 starb 1 Jahr nach der Diagnose, 16 Monate alt, Fall 50 lebt jetzt noch nach 7 Monaten, über 1 Jahr alt). Das läßt darauf schließen, daß diese Kinder wohl nicht schon tuberkulös zur Welt kamen. Eher könnte man an eine ererbte Disposition der Kinder denken. Im Sinne einer vererbbaaren Disposition spricht sich ja vor allem Heubner aus.

Von den aufgeklärten Fällen waren infiziert:

von der Mutter allein	14 = 31,2%
vom Vater allein	15 = 33,3%
von beiden Eltern	4 = 8,9%
Großeltern, Geschwistern, Stiefgeschwistern und sonstigen Verwandten	7 = 15,5%
Pflegern	4 = 8,9%
Angehörigen der Pfleger	1 = 2,2%
	45 100,0%

Auffallend ist, daß hier der Vater öfter als die Mutter in Betracht kommt. Das widerspricht der sonstigen Erfahrung. Wenn es auch bekannt ist, daß der tuberkulöse Vater oft die Pflege der Kinder übernimmt, während die Frau der Arbeit nachgeht, und wenn man auch weiß, daß bei tuberkulösen Vätern noch viele Kinder rasch hintereinander geboren und dann durch Tuberkulose hingerafft werden können. (Beweis sind die Geschwister Fall 3, Fall 15, Fall 16 und die Fälle 53 und 54), während die tuberkulöse Mutter meist durch Schwangerschaft so geschädigt wird, daß sie der Tuberkulose bald erliegt, so habe ich doch für dieses Überwiegen der Infektion ex patre keine Erklärung.

Bei einigen Fällen war die Zeit, in welcher das Kind Gelegenheit gehabt hatte, sich zu infizieren, sehr kurz gewesen. Fall 32 war im Alter von 5 Wochen nur 5 Tage lang mit seinem hochgradig tuberkulösen Großvater zusammen gewesen und starb im Alter von 9 Monaten an Tuberkulose. Die Mutter des Kindes 43 wäscht in einer tuberkulösen Familie, nahm das Kind häufig dorthin mit, wobei Familienmitglieder oft die Wartung übernahmen. Fall 62 ist wahrscheinlich von seiner Großmutter infiziert, die aber nicht im gleichen Hause wohnte, sondern nur bei gelegentlichen Besuchen mit dem Kinde zusammen kam.

Daß ein ganz kurzes Zusammensein mit Tuberkulösen genügt, um eine Infektion herbeizuführen, ist verschiedentlich (Wassermann, Hamburger) nachgewiesen worden. Letzterer erwähnt einen Fall, wo ein gesundes Kind nur wenige Tage mit einem an offener Tuberkulose leidenden Knaben zusammen spielte und schon dadurch Tuberkulose akquirierte.

Welch verschlungene Pfade oft die Infektion geht, zeigt der in der Statistik nicht berücksichtigte, weil noch nicht abgeschlossene Fall Hack. Das Kind stammt aus zweiter Ehe der gesunden Mutter mit einem gesunden Mann. Der erste Mann war an Tuberkulose gestorben, aus dieser Ehe stammte eine Tochter, die vom Vater tuberkulös infiziert war. Diese pflegte und infizierte infolgedessen auch das Kind.

Welcher Art nun die Wege sind, auf welcher die tuberkulöse Infektion zu Stande kommt, ob auf intestinalem oder auf bronchopulmonalem, kann man an meinem Material nicht nachweisen. Eine sichere primäre Darmtuberkulose befindet sich darunter nicht. Ob überhaupt die Infektion besonders durch Einatmen erfolgt, was ja bei dem so oft nahen Zusammensein zwischen Pflegeperson und Kind sehr möglich wäre, oder ob der Kontaktinfektion eine größere Bedeutung beizupflichten ist, darüber geben diese Fälle keinen Aufschluß. Nach-

dem Ostermann an den Händen von Phthisikern in 50% der untersuchten Fälle Tuberkelbazillen nachgewiesen hat, kann ich mir wohl vorstellen, daß bei dem hier noch sehr üblichen Auswischen des Mundes Bazillen in die Mundhöhle kommen. Auch der Schnuller kann hier eine Rolle spielen, und ich erinnere mich selbst, daß ich der tuberkulösen Mutter des Kindes Pielen, Fall 52, Vorhaltungen machte, weil sie den Schnuller erst mit ihrem Speichel befeuchtete und dann dem Kinde in den Mund steckte. Dagegen spricht allerdings, wie gesagt, die Tatsache, daß zur intestinalen Infektionen sehr große Bazillenmengen nötig sind. Aber die Möglichkeit einer Verletzung der Mundschleimhaut oder einer Impfung in die Tonsillen ist vorhanden.

Noch ein weiterer Infektionsweg von Mutter zu Kind ist möglich, der nämlich, daß die Infektion des Kindes in utero oder intra partum erfolgt. Unter meinen Fällen befindet sich eine ganze Anzahl, bei denen diese Möglichkeit nicht direkt auszuschließen ist.

Die Theorie von der kongenitalen Erwerbung der Tuberkulose hat in neuerer Zeit wieder sehr an Bedeutung gewonnen und ihre Möglichkeit ist durch eine ganze Reihe einwandfreier Fälle bewiesen. Eine besondere Stütze für diese Ansicht bildeten die Befunde von Schmorl, der unter 12 Plazenten bei 6, von Schlimpert, der unter 7 Plazenten bei 5 und von Sitzenfrey, der unter 26 Plazenten bei 7 tuberkulöse Veränderungen fand. Schmorl und Geipel hatten bei allen Fällen von Plazentatuberkulose auch Bazillen im Fötus nachgewiesen.

Diese Fälle von kongenitaler Tuberkulose sind aber doch wohl mehr oder weniger als Ausnahmen aufzufassen. Denn keiner der Fälle mit nachgewiesener kongenitaler Tuberkulose lebte länger als $\frac{1}{2}$ Jahr. So ist mir auch der Fall von Kerscher, bei dem die Kutanimpfung erst im vierten Monat gemacht wurde und das Kind im Alter von 6 Monaten starb, nicht beweisend. Aus der Größe der tuberkulösen Veränderung kann man

nur sehr vorsichtig Schlüsse darauf ziehen, daß der Prozeß schon von längerer Dauer sein muß als das extrauterine Leben des Kindes; man kann in Röntgenaufnahmen oft sehen, wie solche tuberkulöse Prozesse, fast wie ein eitriger Prozeß im Gewebe des Säuglings fortschreiten. Und schon die tägliche Erfahrung weist nach, daß die Sterblichkeit unter den Kindern tuberkulöser Mütter, auch hochgradig tuberkulöser Mütter, nicht 100% beträgt, daß sogar bei der Mehrzahl der Kinder keine Tuberkulose aufgefunden werden kann, wenn sie frühzeitig genug, bevor also extrauterin eine Ansteckung erfolgte, von der Mutter entfernt wurden. Berühmt in dieser Hinsicht ist der Versuch Bernheims, der bei 3 Zwillingspaaren in der Weise eine Trennung vornahm, daß er je ein Kind bei der tuberkulösen Mutter ließ, während das andere von ihr entfernt wurde. In allen Fällen blieben die von der Mutter entfernten Kinder gesund, während die anderen an Tuberkulose erkrankten. Epstein hat eine Anzahl von Fällen berichtet, wo die Kinder sofort nach der Geburt von der tuberkulösen Mutter getrennt wurden und vollständig gesund blieben.

Auch die statistischen Arbeiten Weinbergs sprechen entschieden gegen eine größere Häufigkeit der kongenitalen Tuberkulose. Von 154 Kindern, die im letzten Lebensjahr der in den Jahren 1873—1882 in Stuttgart an Tuberkulose verstorbenen Mütter geboren waren, hatten mindestens 24, d. i. 15,6% das 20. Lebensjahr erreicht.

Diese Zahl ist verhältnismäßig sehr hoch, wenn man bedenkt, unter welch ungünstigen Umständen diese Kinder ihr Säuglings- und frühes Kindesalter durchlebten. Wir können wohl annehmen, daß fast alle Kinder dem Proletariat entstammten. Denn in besser situierten Kreisen wird eine Frau, die sich in diesem Stadium der Phthise befindet, fast immer geschont. Weiter können wir wohl annehmen, daß keines dieser Kinder Brustnahrung erhalten hat. Wenn wir nun ferner noch bedenken,

daß diese Kinder so ziemlich alle im ersten Lebensjahr auf fremde Pflege, oder, was beinahe noch schlimmer ist, auf die Pflege älterer, meist noch nicht erwachsener Geschwister angewiesen waren, so können wir ruhig den Prozentsatz der Überlebenden als einen relativ hohen bezeichnen.

Weinberg hat weiter nachgewiesen, daß von den in den sieben letzten Jahren der tuberkulösen Mütter geborenen Kinder ca. 40% das 21. Lebensjahr erreicht haben.

Es wäre nun möglich, daß auch bei einigen von meinen Fällen kongenitale Tuberkulose vorlag. So vor allem bei Fall 2, welcher am 36. Lebenstag positiv reagierte. Wenn wir aber bei Hamburger finden, daß in einigen Fällen, bei denen er die Zeit der Infektion genau begrenzen konnte, die höchstmögliche Dauer des Intervalls zwischen Infektion und Auftreten der positiven Kutanreaktion 41, 42, 48 Tage waren, so müssen wir auch bei diesem Fall die Möglichkeit einer Extrauterininfektion annehmen.

Zarfl veröffentlichte erst vor kurzem einen Fall, wo sich bei einem im 24. Lebenstag gestorbenen Kind käsiges Pneumonie fand. Er ist der Ansicht, daß es sich auch hier nicht um kongenitale, sondern um Inhalationstuberkulose handelt, da sich nur ein isolierter Lungenherd fand. Immerhin wären dafür auch noch andere Erklärungen, z. B. Aspiration von Fruchtwasser intra partum möglich.

Dagegen verfüge ich über 7 Fälle, in denen das Kind von der tuberkulösen Mutter unmittelbar oder kurz nach der Geburt getrennt wurde und sich in keinem Fall Tuberkulose nachweisen ließ.

Distelhorst, Robert, am 15. 3. 12 wegen schwerer Tuberkulose der Mutter vorzeitig künstlich entbunden, am 16. 3. eingeliefert. Körperlänge 44 cm, Gewicht 1800 g. Kind ist jetzt noch in der Klinik, hat jetzt noch negativen Pirquet (8 Monate alt). Die Entwicklung ist

relativ gut, nur durch häufige Ekzeme und Schnupfen gestört.

Neubert, Wally, geb. 23. 2. 1911 (aus der Säuglingsfürsorge). Mutter des Kindes war damals schon tuberkulös, war anfangs 1912 8 Wochen in Lippspringe und starb im Juni 1912 an Tuberkulose. Das Kind ist in der hiesigen Hebammenlehranstalt geboren; ich betone das deshalb, weil natürlich in einem Krankenhaus der Kontakt zwischen Mutter und Kind kein so inniger ist, wie im Privathaus. Im Alter von 3 Tagen war das Kind aus äußeren Gründen von der Mutter entfernt worden. Am 20. 3. 12 und am 12. Nov. 1912 war Pirquet immer negativ.

Okenfeld, Anton, geb. am 16. 5. 1910. In die Klinik aufgenommen als Frühgeburt von 2100 g am 19. 5. 1910. Mutter des Kindes kurze Zeit nach der Geburt an Tuberkulose gestorben. Wegen seiner lymphatischen Konstitution und Spasmophilie blieb das Kind bis zum 11. 11. 11 in der Klinik. Wurde in dieser Zeit oftmals pirquetisiert, ohne jemals positiv zu reagieren.

Roggendorf, Georg, geb. am 17. 7. 09 auf der medizinischen Abteilung der Krankenanstalt Lindenburg. Mutter sterbend an Miliartuberkulose. Das Kind, das 1850 g wog, wurde sofort in die Kinderklinik gebracht. Auch dieses Kind blieb lange Zeit, bis Juni 1911 in klinischer Behandlung, wurde mehrmals pirquetisiert und zeigte nie positive Reaktion.

Simon, Frieda, geb. am 19. 6. 1910. Mutter hochgradig tuberkulös, weshalb das Kind wegen mangelnder häuslicher Pflege am 1. 8. 1910 in ein Kinderheim (Antoniusheim) aufgenommen wurde, wo es sich heute noch befindet. Am 10. 6. 1912 kam das Kind wegen Bronchopneumonie in die Klinik. Pirquet war negativ. Eine Nachprüfung am 1. 11. 12 ergab ebenfalls negatives Resultat.

Schuhmann, Hilde, geb. 17. 4. 1912 in der Hebammenlehranstalt. Die Mutter wurde von dort aus wegen

hochgradiger Tuberkulose direkt in die innere Klinik verlegt. Das Kind blieb vorerst bei ihr, doch kann der Kontakt zwischen der bettlägerischen Mutter, die das Kind nicht besorgen konnte, und dem Kind kein sehr enger gewesen sein. Am 7. 5. 1912 kam das Kind in die Kinderklinik, Gewicht 3000, Pirquet war negativ, blieb es auch bei weiteren Impfungen bis zur Entlassung am 23. 11. 12. Das Kind gedieh gut, überstand auch im September bis Oktober 1912 eine Pertussiserkrankung ohne besondere Störung in seiner Entwicklung.

Schwister, Gertrud, geb. am 28. 10. 1911. Eingetreten am 21. 12. 1911. Die Mutter des Kindes war gleichzeitig mit dem Kind in die Krankenanstalt aufgenommen worden wegen Miliartuberkulose. Sie starb 10 Tage nach der Aufnahme und es ist wohl anzunehmen, daß sie auch in der Zeit vor der Krankenaufnahme die Pflege des Kindes nicht hatte besorgen können. Das Kind blieb in der Klinik bis zum 28. 5. 1912, wurde dann im Alter von 7 Monaten entlassen. Pirquet war immer negativ.

Nachdem also bei allen Fällen, wo das Kind bald nach der Geburt von der tuberkulösen Mutter getrennt worden war, sich keine Tuberkulose entwickelt hatte, ist doch wohl anzunehmen, daß dieses Vorkommen das gewöhnliche, die kongenitale Tuberkulose die Ausnahme bildet.

Ich verfüge noch über 2 Fälle, wo das Kind bei der tuberkulösen Mutter verblieben war und trotzdem tuberkulosefrei blieb.

Müller, Maria, Schwester des tuberkulösen geheilten Falles 2. Das Kind ist um zwei Jahre jünger als ihre Schwester, wurde wie diese von der tuberkulösen Mutter gestillt und bot immer negative Pirquetsche Reaktion. Im Juni 1912 wurde die letzte Impfung gemacht, kurz darauf überstand das Kind ohne weitere Nachteile eine Masernerkrankung.

Probst, Hans (Fürsorge), geb. 9. 7. 1911. Mutter leidet an offener Tuberkulose, hat das Kind einige Zeit

ausschließlich gestillt, später Flasche beigegeben. Das Kind wurde mehrmals pirquetisiert, zuletzt am 8. 11. 12 und bot immer negative Reaktion.

Schlußfolgerung.

1. Selbst bei einem sehr ungünstigen Material bleiben 11,4% der erkrankten Säuglinge am Leben. Von den Verstorbenen erreichte auch eine erhebliche Zahl das zweite Lebensjahr, um dann an interkurrenten Krankheiten oder infolge dieser an Miliartuberkulose zu Grunde zu gehen.

2. Von wesentlicher Wichtigkeit für die Prognose ist der gute Kräftezustand des Kindes.

3. Gegenüber den Behauptungen von der Häufigkeit der kongenitalen Tuberkulose zeigen unsere 7 Fälle, in denen das Kind bald nach der Geburt von der phthisischen Mutter getrennt wurde, in jedem Fall Verschontbleiben von der Tuberkulose.

Tuberkulose, festgestellt im Alter von unter 3 Monaten.

Nr.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Kürten Matthias 29. XI. 1907	83 Tg.	Pir- quet pos.	6130 [110 %]	Br.	Milztumor. Lunge: LVU verschärftes Atmen	gest. nach 2 Mt.	Miliare und submiliare Knötchen in sämtlichen Lungenabschnitten. Miliartuberkulose der Leber, Milz. Verkäste Bronchial- und Mesen- terialdrüsen	Vater
2	Müller Johanna 25. XI. 1908 Polikl.	36 Tg.	Pir- quet pos.	4490 [108 %]	Br.	Keine	Lebt jetzt noch, 4 J. alt	Die Mutter hatte das Kind 11 Mon. gestillt, obwohl sie offene Tuber- kulose hatte	Mutter
3	Pelzer Elise II 4. XII. 1908 Polikl. (In die Klinik aufgenommen 12. I. 09)	81 Tg.	Pir- quet pos.	4480 [89 %]	Br.	Adenopathischer Husten, ständige Gewichtsabnahme	gest. nach 46 Tg.	Verkäste Drüsen rechts an der Trachea, daneben kleinere, ebenso am r. Hilus. Im rechten Oberlappen ein Käseherd mit Kaverne im Inneren. In beiden Lungen, in Leber, Milz, Nieren, Darm, Mesen- terium Miliartuberkulose	Vater
4	Schleimbach Robert 15. VI. 1910	71 Tg.	Pir- quet pos.	2580 [60 %]	K.	Keine. Im Röntgenbild am 21. VI. 10: Schatten von Hilusdrüsen. In der l. Lunge ein kleiner, scharf begrenzter Schatten	gest. nach 3 Mt.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Kaverne im l. Oberlappen, klei- nere Herde in beiden Lungen, Miliartuberkulose aller Organe	Pflegefrau. Kind war von 30. IV. bis 5. VI. bei einer tuberku- lösen Pflegefrau
5	Schmitz Helene 3. VIII. 1911	88 Tg.	Menin- geale Erschei- nungen	4340 [78 %]	K.	Seit etwa 14 Tagen Er- brechen bei jeder Nah- rung. Fieber, Bewußt- losigkeit, Krämpfe	gest. nach 3 Tg.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Miliartuberkulose aller Organe	Unbekannt

Uderrakht

6	Wessel Wilhelm 28. II. 1912 In die Klinik aufgenommen am 9. I. 1912	69 Tg.	Pirquet pos.	3020 [57 %]	K.	LVO Dämpfung u. Rel- schärftes Aumen. Rönt- genbild am I. III.: Bron- chialdrüsenvergrößerung, die ganze linke Lunge von ausgedehnten Schatten durchsetzt	gest. nach 16 Tg.	Am 12. I. 1912 (20. Lebens- tag) Pirquet negativ gewesen. Vom 28. Lebens- tag bis zum Exitus war Pat. in der Klinik. Verkäste Bronchial- und Mesenterial- drüsen, Käscheid im linken Oberlappen. Miliartuberkulose aller Organe mit Aus- nahme von Hirn und Hirnhäuten
---	--	--------	-----------------	----------------	----	--	----------------------	---

Tuberkulose, festgestellt im Alter von 3—6 Monaten.

7	Barthel Auguste 15. VII. 1909	3 1/2 Mt.	Durch Sektion festge- stellt	4000 [66 %]	3 Mte. Brust, dann K.	Kind war sehr elend. Keine Symptome der Tuberkulose	gest. 3 Tg. nach Ein- lieferung	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Akute Miliartuberkulose der Lungen, Leber, Milz	Vater
8	Berghoff Maria 1. VI. 09	5 1/2 Mt.	Durch Sektion festge- stellt	?	?	Üb. beiden Lungen Rasseln, Milztumor. Nackensteife	gest. 2 Tg. nach Ein- lieferung	Meningitis tuberculosa. Verkäste Bron- chial- und Mesenterialdrüsen. Infiltra- tionen der Lunge. Pleuritis tuberculosa. Miliare Herde in Leber und Milz. Darmgeschwüre	Vater
9	Dünnborstel Friedrich 22. IX. 1907	5 Mt.	Pirquet pos.	5040 [72 %]	K.	Husten. Schallabschwä- chung üb. der l. Lunge. LHF feuchtes Rasseln. [Wahrscheinlich krup- pöse Pneumonie, da kritischer Temperatur- abfall]	gest. nach 5 Mt.	Kind hatte in den 5 Monaten immer Lungenerscheinungen Zahlreiche bronchopneumonische Herde. Pleuritis adhaesiva rechts. Kaverne im r. Unterlappen. Tbk. der Bronchial- und Mesenterialdrüsen. Enteritis. Appendi- citis non tuberculosa	Eltern. Mutter kurz nach Auf- nahme d. Kindes an Tbk. gest. Vater kommt in Lungenheil- stätte
10	Hauschild Peter 5. VIII. 1910	4 Mt.	Durch Sektion festge- stellt	?	K.	Moribund einge- liefert	gest. einige Stunden nach Einlieferung	Verkäste Bronchial- und Mesenterial- drüsen. Ein größerer Herd im r. Unter- lappen. Meningitis tuberculosa. Generalisierte Tuberkulose	Unbekannt
11	Kaul Anna 26. IV. 1909	3 1/2 Mt.	Pirquet pos.	4100 [68 %]	Brust, später K.	Adenopathischer Husten	gest. nach 2 Wochen	Tuberkulose der Bronchial- und Hilus- drüsen. Pleuritis adhaesiva. Pneumo- nische Infiltration der l. Lunge. Miliar- tuberkulose der l. Lunge	Pflegeerin (ein tuberkulöses) Mädchen

Nr.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
12	Konrad Gretchen 28. VI. 1909	4 Mt.	Pirquet pos.	5000 [79 %]	K.	Husten. Links vorne Schallverkürzung. Rönt- genbild: Infiltration des I. Oberlappens	Lebte noch im Sept. 1912 (3½ J. alt)	Kam später auf die chirurgische Abteilung	Vater
13	Niedenhof Peter 12. XI. 1909	5½ Mt.	Durch die Sek- tion festge- stellt	?	4 Mt. Brust, dann K.	Über der r. Lunge Däm- pfung. Klinisches Bild der Meningitis tuber- culosa	gest. einige Stunden nach der Einführung	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Käsiges Bronchopneumonie. Meningitis tubercu- losa. Generalisierte Tuberkulose	Großmutter (pflegte das Kind von der 7. Woche bis zum 4. Mt.)
14	Oster Michael 9. IV. 1909	5 Mt.	Pir- quet pos.	4720 [70 %]	?	Husten. Über der ganzen Lunge Rasseln, RHO Bronchialatmen	4W. später in desol. Zust. (3800 g) abgeholt		Unbekannt
15	Pelzer Elisabeth I 27. XI. 1907	4 Mt.	Pirquet zweif- elhaf. D. Sekt. festgest.	4000 [63 %]	Brust, dann K.	Symptomen- komplex der Menin- gitis tuberculosa	gest. 10 Tg. nach Ein- führung	Verkäste Bronchial- und Mesenterial- drüsen. Milartuberkulose von Gehirn, Meningen, Lungen, Leber, Milz, Nieren. (2 Geschwister Nr. 3 und 16) ebenfalls als Säugling an Tbk. gest.)	Vater
16	Pelzer Hermann 8. VII. 1912	5 Mt.	Pir- quet pos.	4500 [70 %]	K.	Adenopathischer Husten	gest. nach 6 Wochen	Im Alter v. 1 Mt. ward der Pirquet negativ gewesen (Podikt). Tbk. d. Bronchial- u. Mesenterialdrüsen. Allgem. Milartuberk. Darmgeschwüre. (cf. Geschw. Nr. 3 und 15)	Vater
17	Rabenhorst Erich In d. Klinik auf- 27. IV. 1911	3 Mt.	Durch die Sek- tion festge- stellt	3700 [64 %]	K.	Leber- und Milz- schwellung. (Es be- stand auch Lues)	gest. 8 Tg. nach Auf- nahme	Verk. Bronch.- u. Hihud. Peribronchitis caseosa. Tuberkulose der Leber und Milz, Fettleber. Peritonitis fibrosa. Tuberkulöse Magen- u. Darmgeschwüre. (Osteochondritis luetica)	Eltern
18	Reimer Anna 2. I. 1909	4½ Mt.	Pir- quet pos.	5570 [83 %]	Brust	Keine	gest. nach 1 J.	Kind hatte sich gut entwickelt, bis plötz- lich starker Gewichtsabsturz und Fieber eintrat, 6 Wochen später Exitus. Kurze Zeit mit Tuberkulin behandelt. Tuberkulose der Bronchial- und Mesen- terialdrüsen. Adhäsivpleuritis links. Meningitis tuberc. Tuberkulome im Hirn	Vater tuberku- lös. Doch war das illegitime Kind nie mit ihm zusammen ge- wesen

19	Scheidgen Elise 29. VIII. 1911	5½ Mt.	Pir- quet pos.	4600 [62 %]	K.	Symptomen- komplex der Menin- gitis tuberculosa	gest. nach 7 Tg.	gest. nach: Meningitis tuberculosa. Brust- und Bauchhöhle nicht sezirt. Schwester von Fall 20	Mutter
20	Scheidgen Josefine 3. V. 1909 In die Klinik auf- genommen 8. III. 1909	6 Mt.	Pir- quet pos.	3130 [42 %]	K.	Keine	gest. nach 3 Mt.	Bei Eintritt (8. III. 09) war Pirquet negativ gewesen. Mit Tuberkulin behandelt. Tbk. d. Lungen. Kaverne r. Darm- geschwüre. Schwester v. Fall 19	Mutter
21	Schiefer Wilhelm 30. XII. 1909	3½ Mt.	Pir- quet pos.	3230 [52 %]	?	Vergrößerte Axillar- und Zervikaldrüsen	gest. nach 3 Wochen	Mit Tuberkulin behandelt, aber nur 4mal gespritzt. Nicht sezirt.	Vater
22	Stute Wilhelm 20. XI. 1907 In die Klinik auf- genommen 2. XI. 1907	4 Mt.	Pir- quet pos.	5590 [82 %]	K.	Keine	gest. nach 3 Mt.	Bei der Aufnahme (2. XI. 07) war Pirquet negativ. Tbk. d. Bronchial- u. Mesenterial- drüsen. Kaverne im l. Unterlappen. Miliartuberkulose aller Organe	Mutter
23	Thielen Gottfried 27. II. 1912	3½ Mt.	Pir- quet pos.	3520 [60 %]	K.	Auf den Lungen RHO und LHU Schallverkürzung. Röntgenbild: Beiderseits deutliche Bronchialdrü- sens Schatten. R. Spitze gegen die linke ver- dunkelt. Links unten ebenfalls Schatten	gest. nach 4½ Mt.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Kavernen. Links fibrinöse Pleuritis und serofibrinöse Perikarditis	Mutter (noch vor dem Kind gest.)
24	Weiß Gustav 11. III. 1908	5 Mt.	Pir- quet pos.	5380 [77 %]	K.	Husten. Diffuses Giemens, vereinzeltes Rasseln über der ganzen Lunge	gest. nach 5 Wochen	Verkäste, zum Teil erweichte Bronchial- u. Mesenterialdrüsen. In der linken Lunge mehrere Ka- vernien. Miliartuberkulose der Leber, Milz, Nieren	Großmutter mütterlicher- seits und 2 Ge- schwister der Mutter tuberku- lös, in gleicher Wohnung

Tuberkulose, festgestellt im 2. Lebenshalbjahr.

Z.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
25	Bär August 9. I. 1907	11½ Mt.	Koch pos.	4500 [42 %]	Brust, dann K.	Rasseln über der ganzen Lunge	gest. nach 10 Tg.	Nicht seziert	Unbekannt
26	Braun Hermann 6. IX. 1911	9 Mt.	Durch die Sek- tion	4500 [50 %]	K.	Symptome der Me- ningitis tuber- culosa	gest. nach 10 Tg.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Tuber- kulose des 1. Unterlappens. Allgemeine Miliartuberkulose. Meningitis tuber- culosa	Unbekannt
27	Briand Ernst 25. X. 1911	9½ Mt.	Pir- quet pos.	5800 [65 %]	Brust, dann K.	War schon 3 Monate vor- her wegen Bronchitis in der Poliklinik behandelt. Bei Aufnahme Dämpfung LO.	gest. nach 12 Tg.	Verkäste Bronchial- und Mesenterial- drüsen. Linke Lunge adhärent, im Ober- lappen große Kaverne. Peribronchitis caseosa rechts. Miliartuberkulose der Lunge, Leber, Milz, des Darmes	Vater
28	Dunkel Hermann 11. VIII. 1911	9½ Mt.	Pir- quet pos.	5220 [59 %]	Brust, dann K.	Infiltration im rech- ten Mittel- u. Unter- lappen (kaum tuber- kulös). Keratitis phlyctaenulosa. Otitis media	gest. nach 14 Mt.	Kind war über ein Jahr außerhalb des Hospitals gewesen, kam dann 4 Wochen vor dem Tod mit Miliartuberkulose herein, nachdem es Masern durchgemacht hatte. Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Em- pyem rechts. Tuberkulose der r. Lunge mit Kaverne. Tuberkulose der linken Lunge. Miliartuberkulose der Milz und der Nieren	Mutter
29	Durst Josef 4. I. 1909	10 Mt.	Pir- quet pos.	5140 [56 %]	K.	Verschärftes Asten, besonders über dem r. Mittellappen	gest. nach 6 Tg.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Ka- verne im r. Oberlappen. Thymustuber- kulose. Miliartuberkulose aller Organe	Eltern
30	Eich Willy 15. VI. 1909	11 Mt.	Pir- quet pos.	8080 [85 %]	Brust	Röntgenbild: Rechts am Hilus Drüschatten	Lebte noch im Juni 1911 3 J. alt		Mutter
31	Eiffel Wilhelm 25. V. 1908	11 Mt.	Pir- quet pos.	6080 [64 %]	K.	Dämpfung u. Bron- chialatmen l., Ras- seln r., Milztumor	gest. nach 4 Tg.	Verkäste Bronchial- u. Mesenterialdrüsen. Große Kaverne im l. Oberlappen. Diffuse Käseherde in beiden Lungen. Miliartuber- kulose d. Leber u. Milz, Darmgeschwüre	Mutter

32	Erven Gertrud 17. VIII. 1908	7 Mt.	Pir- quet pos.	4400 [56 %]	K.	Über d. ganzen l. Lunge Schallverkürzung, lautes, klingendes, groß- u. mit- telblas. Rasseln. Über d. r. Lunge ebenf. kling. R.	gest. nach 2 Wochen	Verkäste Bronchial- und Zervikaldrüsen. Kavernen im linken Ober- und Unter- lappen. Rechts bronchopneumonische, z. T. verkäste Herde. Darmgeschwüre. Miliartuberkulose der Leber	Großvater mütterlicherseits. War 5 Tage mit dem Kind zusammen
33	Esser Maria 9. III. 1908	11½ Mt.	Pir- quet pos.	6150 [65 %]	Brust, dann K.	Über dem l. Unterlappen Dämpfung, Bronchialatmen, feinblasiges Rasseln	gest. nach 5 Wochen	Verkäste Bronchial- und Mesenterialdrüsen. Bronchopneumonie des l. Unterlappens, auch sonst bronchopneumonische Herde, sämtlich von Käseherden durchsetzt. Allgemeine Miliartuberkulose	War bis zu 5 Monaten bei tuberkulöser Familienpflege
34	Frings Katharina 19. VIII. 1908	9 Mt.	Pir- quet pos.	7420 [85 %]	Brust	Conjunctivitis und Keratitis phlyctaeulosa	Unbekannt. Nach 2 Mt. entlassen	Mit Tuberkulin behandelt. Doch wurde die Behandlung nach 4 Injektionen abgebrochen	Vater
35	Haas Wilhelm 24. VIII. 1909	9 Mt.	Pir- quet pos.	5830 [66 %]	Brust, dann K.	Keine	gest. nach 9 Mt.	Mit Tuberkulin behandelt. Verkäste Tracheal-, Bronchial- und Mesenterialdrüsen. Infiltration der linken Lunge. Miliartuberkulose d. linken Lunge	Eltern
36	Hegemann Luise 28. III. 1910	6 Mt.	Pir- quet pos.	?	K.	Dämpfung u. Bronchialatmen rechts. Meningitische Reizerscheinungen	gest. nach 3 Wochen	Hatte auch Lues. Verkäste Bronchialdrüsen. Tuberkulose des Ductus thoracicus. Massenhaft Lungenherde und Kavernen. Allgemeine Miliartuberkulose. Meningitis tuberc.	Unbekannt
37	Heinen Nette 3. I. 1912	11 Mt.	Pir- quet pos.	6550 [70 %]	Brust, dann K.	Keine	Entlassen nach 4 Tg. Lebt noch Nov. 1912.	Näheres nicht zu erfahren	Unbekannt
38	Herkath Johann 1. IX. 1912	10 Mt.	Pir- quet pos.	4700 [52 %]	?	Adenopathischer Husten. Auch röntgenologisch kein sicherer Befund	gest. nach 18 Tg.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen, frische Miliartuberkulose aller Organe	Mutter
39	Kölsch Agnes 15. VIII. 1908	7 Mt.	Pir- quet pos.	4600 [58 %]	Brust, dann K.	Dämpfung über der ganzen r. Lunge	gest. nach 3½ Mt.	Mit Tuberkulin behandelt. Tuberkulose der Bronchial- und Mesenterialdrüsen. Kaverne im r. Oberlappen. Pleuritis adhaesiva. Miliartuberkulose der Leber, Lunge, Milz, Darmgeschwüre	Mutter
40	Krebs Irene 17. V. 1910	7 Mt.	Pir- quet pos.	4300 [54 %]	K.	Schwellung der Nacken- und Axilladrüsen. RH Dämpfung und Bronchophonie	gest. nach 7 Mt.	Tuberkulose der Bronchial- und Mesenterialdrüsen. Käsig Pneumonie. Kaverne im l. Unterlappen. Tuberkulose der Leber. Darmgeschwür	Unbekannt

Z.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
41	Krauter Emil 31. XII. 1907	10 Mt.	Pir- quet pos.	5400 [59 %]	K.	Fungus d. l. Kglk. f. d. r. L. Schallverkürzung. RHC rauhes Inspirium, ver- längertes Exspirium mit Gleichen. RV. Knacken	gest. nach 3 Wochen	Tuberkulose der Bronchial- und Mesen- terialdrüsen. Große Kaverne im r. Unterlappen, kleinere Knötchen in anderen Lungenteilen. Peritonitis tuberculosa ohne Erguß. Tuberkulose der Milz	Mutter
42	Keßler August 20. I. 1912	11 1/2 Mt.	Durch die Sek- tion festge- stellt	?	K.	Symptomen- komplex der Menin- gitis tuberculosa	gest. nach 1 Tg.	Eine größere erweichte Bronchialdrüse. Meningitis tuberculosa. Tuberkulöse Er- weichungshöhle im vord. Stirnlappen mit Blutung in dieselbe. Konglomeratuberkel des Hirnes. Allgemeine frische Miliar- tuberkulose in allen Organen	Unbekannt
43	Küpfer Anna 22. VI. 1908	9 Mt.	Pir- quet pos.	5680 [64 %]	Brust, dann K.	Adenopathischer Husten. Drüsenpakete in beiden Achselhöhlen. Der Basis des linken Oberlappens entsprechend Ronchi und Knacken	Entlassen nach 1 Mt. und 4 Tg. Weiteres Schicksal unbekannt	Mutter wäscht in tbk. Familie, nimmt d. K. dort- hin mit. Zeitw. i. Wartung von Familienmitgl.	
44	Malzmüller Anna 27. X. 1910 Polikt.	6 Mt.	Pir- quet pos.	?	K.	Husten	Lebt noch 9. Nov. 1912 (21.7. Mt. alt)	War wegen Spina ventosa auf der chirurgischen Abteilung n. Tuber- kulin behandelt worden	2 Geschwister lungenleidend
45	Meyer Margarete 1. VII. 08 in die Klinik aufgen.	Über 6 Mt.	Durch die Sek- tion festge- stellt	?	Brust, dann K.	Moribund eingelie- fert. Rasseln über der ganzen Lunge	gest. 3 Stunden nach Ein- lieferung	Verkäste Bronchial- und Mesen- terialdrüsen. Konglomeratuber- kel des Hirnes. Tuberkulose der Leber, der Milz, des Darmes	Aus 2. E. 1. M. gest. an Tbk. El- tern d. Mt. gest. an Tbk. 1 direk- tes Geschw. gest. an Lungenleiden
46	Müller Hans 16. II. 1911	1 J.	Pir- quet pos.	6960 [69 %]	K.	Symptomenkomplex der Meningitis tuberculosa	gest. nach 7 Tg.	Verkäste Bronchialdrüsen. Konglome- ratuberkel des Gehirnes. Peritonitis tuberculosa. Bronchopneumonie	Mutter
47	Müller Heinrich 15. II. 1908	11 Mt.	Pir- quet pos.	6200 [66 %]	K.	Meningitische Symptome	gest. nach 6 Tg.	Tuberkulose der Bronchial- und Mesen- terialdrüsen. Kaverne im r. Oberlappen. Meningitis tuberculosa. Miliartuberku- lose der Lunge, Leber, Milz, Nieren	Unbekannt

48	Müller Wilhelm 27. IV. 1911	10 Mt.	Pir- quet pos.	7200 [85 %]	K.	Adenopathischer Husten. Schwellung der Nackendrüsen	Entlassen nach 18 Tg. Unbekannt	Unbekannt
49	Müller Karl 15. IV. 1907	8 Mt.	Durch Sektion festge- stellt	5760 [68 %]	K.	Symptomenkomplex der Meningitis tuberculosa	gest. nach 5 Tg.	Unbekannt
50	Niedecken Oskar 22. IV. 1912	7 Mt.	Pir- quet pos.	5940 [74 %]	K.	Husten, bronch. Rasseln. Röntgenbild: Bronchial- drüsenpakete. R. Ober- lappen wenig durchl. als l.	Entlassen nach 6 Wch. Lebt noch 12. Nov. 1912	Vater tuberk. Doch war das il- legitime Kind nie mit ihm zusam.
51	Pflug Anna 4. X. 1909	7 Mt.	Durch Sektion festge- stellt	7180 [89 %]	K.	Symptomenkomplex der Meningitis tuberculosa. Schwellung der Nacken- drüsen	gest. nach 5 Tg.	Sohn der Pflege- frau tuberkulös
52	Pielen Wilhelm 21. VII. 1911	7 Mt.	Pir- quet pos.	4340 [54 %]	K.	Drüsenanschwellung in Nacken und Achselhöhlen	gest. nach 1 Mt.	Mutter sieht sehr phthisisch aus
53	Pöppel Alexander 3. II. 1910	11 Mt.	Pir- quet pos.	5290 [56 %]	K.	Zahlreiche Ronchi über der ganzen Lungc. Husten	gest. nach 2 1/2 Mt.	Vater
54	Pöppel Arthur 15. VII. 1912	10 Mt.	Pir- quet pos.	7540 [82 %]	K.	Adenopathischer Husten	gest. nach 4 Mt.	Vater
55	Rademacher Margarete 15. X. 1907	11 1/2 Mt.	Pir- quet pos.	5310 [54 %]	K.	Über beiden Lungen dif- fuses Rasseln. Husten. (kaum tuberkulös, da später verschwunden)	gest. nach 1 Mt.	Großmutter tu- berkulös, pflegte das Kind
56	Roggenbuk Anna 26. XI. 1907	9 1/2 Mt.	Pir- quet pos.	4100 [46 %]	Brust, dann K.	Rasseln über der ganzen Lunge	gest. nach 1 Mt.	Unbekannt

Meningitis tuberculosa

Wog am 12. XI. 12 (14 Monate alt)
7130 g. Beginnt zu laufen.
Pirquet stark positiv

Meningitis tuberculosa, allge-
meine Miliartuberkulose

Starb unter den Erscheinungen der
Miliartuberkulose. Nicht sezirt.

Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Käsig
Hepatisation des l. Oberlappens mit
Kaverne. Peribronchitische Herde in der
übrigen Lunge. Miliartuberkulose des
Herzens, d. Leber u. Nieren, größere Herde
in Milz und Netz. Bruder von Nr. 54

Ausgedehnte Bronchopneumonie. Ein
subpleuraler Herd l. oben. Verkäste
Bronchial- und Hilustrüsen. Einige
Knötchen. Bruder von Nr. 53

Verkäsung der Bronchialdrüsen. Schwel-
lung der Mesenterialdrüsen. In beiden
Oberlappen und im rechten Oberlappen
einige miliare Herde

Später waren Kavernensymptome aufge-
treten. Große Kaverne im r. Mittel-
lappen, in den übrigen Partien d. Lunge
zahlreiche kleine Kavernen u. Käseherde.
Einige miliare Knötchen in der Leber

Z.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
57	Schlüter Paul 4. V. 1909	10½ Mt.	Pir- quet pos.	4680 [50 %]	K.	Otitis media duplex. Links am Angul. scapulae und weiter unten ver- schärftes Atmen	gest. nach 9 Mt.	Außerhalb der Klinik gestorben. Nichts Genaueres zu erfahren. Nicht sezirt	Unbekannt
58	Schütter Heinrich 10. IV. 1908	6 Mt.	Pir- quet pos.	5400 [72 %]	K.	Diffuses Giemen u. Rasseln über der ganzen Lunge	gest. nach 2 Mt.	Tuberkulose der Bronchialdrüsen. In der rechten Lunge ein kleiner Herd, sonst Lungen frei. An d. Milzoberfläche einige milliare Knötchen	Mutter (z. Z. der Krankenhaus- aufnahme an Tbk. gest.)
59	Stern Else 22. X. 1911	9½ Mt.	Durch die Sek- tion festge- stellt	4200 [48 %]	Brust	Symptomen- komplex der Menin- gitis tuberculosa	gest. nach 8 Tg.	Tuberkulose der Hilus- und Mesenterial- drüsen. Im r. Unterlappen ein großer Konglomerattuberkel und kleinere Knöt- chen. Miliartbk. des r. Unterlappens, der Leber und Milz. Meningitis tuberculosa	Unbekannt
60	Vosen Cäcilie 29. V. 1909	6½ Mt.	Pir- quet pos.	4330 [56 %]	K.	Spina ventosa	gest. nach 1 Mt.	Es entwickelten sich allmählich deut- liche Lungenerscheinungen. Im Auswurf Tuberkelbazillen. Nicht sezirt	Unbekannt
61	Wallendorf Hans 25. III. 1912	9 Mt.	Durch Sektion festge- stellt	4300 [48 %]	?	Spina ventosa. Sym- ptomenkomplex der ali- mentären Intoxikation	gest. nach 1 Tg.	Einige verkäste, nicht erweichte Bron- chialdrüsen. Geheilte Spina ventosa. Nicht an Tuberkulose gestorben.	Unbekannt
62	Weiser Peter 24. I. 1910	10 Mt.	Pir- quet pos.	7420 [81 %]	?	Kinderlähmung? Vi- tium cordis. Keine tuberkulösen Sym- ptome	Unbekannt. in desolatem Zustand am 27. XI. 1910 abgeholt. (1 J. 9 Mt. alt)	Am 8. II. 1910 entlassen. Kam am 15. XI. 10 (1 Jahr 8 Monate alt) wieder ins Hospital. Hatte Nasen durchgemacht. Es bestand peripröktischer Abszeß; auf der ganzen rechten Lunge Dämpfung, an verschiedenen Stellen Bronchialatmen. Röntgenbild: üb. d. r. Lunge und am linken Hilus Schatten	Großmutter mütterlicher- seits lungen- krank, wohnte aber nicht im Hause
63	Zaun Heinrich 6. V. 1910	10 Mt.	Pir- quet pos.	6000 [65 %]	Brust, dann K.	Über dem l. Unterlappen leicht tympanitischer u. verkürzter Schall, etwas Bronchialatmen	Lebte noch 11. Dez. 1911 (2 J. 5 Mt. alt)	Kind war bei den Eltern, erschien öfters in der Poliklinik. Zuletzt pir- quetisiert im April 1911, positiv	Vater

Unbekannt

Vater

Vater

Schon veröffentlicht sind die Fälle 2, 12, 20, 35, 39, bei Rohmer, Fall 44 bei Bungart (hier unter Nr. 13).

Noch in Beobachtung sind heute 10. XI. 1912:

64	Zaun Maria 13. XI. 1907	7 Mt.	Pirquet pos.	5000 [63 %]	Brust, dann K.	RVO geringe Dämpfung. L. Hinten Rasseln	gest. nach 1 Mt.	Siebt unter Zunahme der Lungener- scheinungen und Symptomen von Meningi- tis. Nicht sezirt.	Unbekannt
65	Zimmer- mann Heinrich 17. VII. 1911	7 Mt.	Pirquet pos.	5600 [70 %]	Brust, dann K.	Keine	Lebte noch am 8. Nov. 1912	Bei Nachuntersuchung 8. XI. 12 (22 1/2 Mte. alt). Gew. 10140 g. Sieht gut aus, läuft. Masern überstanden. Diffuse Bronchitis. Pirquet pos. Vater erst vor 3 Wochen gest.	Vater
66	Zimmer- mann Margarete 30. III. 1908	11 Mt.	Pirquet pos.	6200 [65 %]	K.	Drüsenanschwellung an Hals und Axilla. Über beiden Unterlappen grobes Rasseln und Gleiten	gest. nach 2 1/2 Mt.	Allmähliche Zunahme der Lun- generscheinungen. Im Sputum Tuberkelbazillen nachgewiesen. Nicht sezirt	Vater

Börner Wilhelm 26. X. 1912 Poliklinik	72 Tg.	Pirquet pos.	4120 [84 %]	K.	Keine	Kam am 19. Nov. mit Meningitis u. Lungener- scheinungen in die Klinik	Unbekannt	
Geritan Gertrud 5. VII. 1912 (Firsorge)	42 Tg.	Pirquet pos.	4600 [107 %]	Brust	Keine, auch Rönt- genbild negativ	Entwickelt sich an der Brust gut	Vater	
Hack Josef 22. V. 12	6½ Mt.	Pirquet pos.	4450 [59 %]	Brust, dann K.	Adenopathischer Husten. Grobes Rasseln, und ver- schärftes Exspirium. Im Röntgenbild Lungen- u. Drüsenherde.	Nimmt lang- sam zu	Pirquet war am 11. III. 1912 (3 Monate alt) negativ	Stiefeschwe- ster, die das Kind pflegte

Literatur.

- Aronade, Über Säuglingstuberkulose. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose 1909. Bd. 13.
- Aronade, Die Tuberkulose der Säuglinge. Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde. 1909. Bd. IV.
- Binswanger, Über probatorische Tuberkulininjektionen bei Kindern. Archiv für Kinderheilkunde. 1906. Bd. 43.
- Bungart, Über Versuche mit Tuberkulin in der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. 113.
- Cornet, Die Tuberkulose. Nothnagels Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Wien 1907.
- Czerny, Die erste Vorlesung in Straßburg. Monatsschrift für Kinderheilkunde. 1910. Bd. 9.
- Deutsch, Vortrag im Ärztlichen Verein Frankfurt. Referat. Dtsch. med. Wochenschrift. 1910. Nr. 32.
- Engel u. Bauer, Klinische und experimentelle Studien zur Pathologie und Therapie der Tuberkulose im Kindesalter. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Bd. 13. 1909.
- Engel, Säuglingstuberkulose und Ernährung. Monatsschrift für Kinderheilkunde. 1909. Nr. 1.
- Escherich, Über Indikation und Erfolge der Tuberkulintherapie bei der kindlichen Tuberkulose.
- Finkelstein, Die tuberkulöse Infektion im Säuglingsalter. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1. Jg.
- Finkelstein, Lehrbuch der Säuglingskrankheiten. 1. Bd. 1905.
- Fuchs, Über die Behandlung tuberkulöser Kinder mit hohen Tuberkulindosen. Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde. 1909.
- Gärtner, Über die Erbllichkeit der Tuberkulose. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1893. Bd. 13.
- Geipel, Über Säuglingstuberkulose. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1906. Bd. 53.
- Ghon, Der primäre Lungenherd des Kindes. Wien und Berlin 1912.
- Hahn, Über die Prognose der Säuglingstuberkulose. Monatsschrift für Kinderheilkunde. Bd. X. 1912. Nr. 10.
- Hamburger, Die Tuberkulose des Kindesalters. 2. Aufl. Wien 1912.
- Hamburger und Sluka, Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulose im Kindesalter. Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 62. 1905.
- Heubner Lehrbuch für Kinderheilkunde. 2. Aufl. 1906.
- Heubner, Familiäre Prophylaxe der Tuberkulose. Zeitschrift für Tuberkulose. 1905. Nr. 1.
- Heubner, Diskussionsbemerkungen zum Vortrag Schloßmanns. Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde. 1905. Bd. 22.
- Hillenber, Kindheitsinfektion und Schwindsuchtsproblem. Dtsch. med. Wochenschrift 1912. Nr. 43.
- Heymann, Beziehungen zwischen Säuglingsernährung und Tuberkulose. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. Bd. 60. 1908.
- Ibrahim, Die Säuglingstuberkulose im Lichte älterer und neuerer Forschungen. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. 1905. Bd. IV.
- Kerscher, Kasuistischer Beitrag zur Lehre über kongenitale Tuberkulose. Inaugural-Diss. Erlangen. 1909/10.
- Kolle und Hetsch, Experimentelle Bakteriologie und Infektionskrankheiten. 2. Aufl. Berlin 1908. 34. Vorlesung.

- Krämer, Die kongenitale Tuberkulose und ihre Bedeutung für die Praxis. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. 1908.
- Monti, Über Tuberkulose. Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen. 1901. Heft 9.
- Osternann, Die Bedeutung der Kontaktinfektion für die Ausbreitung der Tuberkulose, namentlich im Kindesalter. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. Bd. 60. 1908.
- Pollak, Über Säuglingstuberkulose, Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. 1911. Bd. 19.
- Morgenroth, Die kutane Tuberkulinimpfung nach v. Pirquet bei Kindern des 1. Lebensjahres. Münch. med. Wochenschrift. 1908. Nr. 16.
- Rietschel, Über kongenitale Tuberkulose. Jahrbuch für Kinderheilkunde. 1909. Bd. 60.
- Rohmer, Tuberkulose und Tuberkulintherapie im Säuglings- und frühen Kindesalter. Archiv für Kinderheilkunde. Bd. 52, 55, 56, 1909, 1911.
- Schloßmann, Tuberkulose in Pfaundler-Schloßmann, Handbuch der Kinderheilkunde. 2. Bd.
- Schloßmann, Die Tuberkulose im frühen Kindesalter. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. Bd. 6. 1906.
- Schloßmann, Entstehung der Tuberkulose im frühen Kindesalter. Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde. Meran 1905. Bd. 22.
- Schmorl u. Geipel, Über die Tuberkulose der menschlichen Plazenta. Münch. med. Wochenschrift. 1904. S. 1676.
- Schmorl u. Kockel, Die Tuberkulose der menschlichen Plazenta und ihre Beziehungen zur kongenitalen Infektion mit Tuberkulose. Zieglers Beiträge, Bd. 16. 1894.
- Sehlbach, Über die Häufigkeit der Tuberkulose und die beiden Hauptzeitpunkte der Ansteckung mit derselben im Säuglingsalter. Münch. med. Wochenschrift. 1908. Nr. 7.
- Siegert, Die kutane Tuberkulinreaktion (v. Pirquet) im ersten Lebensjahr, speziell im ersten Lebenshalbjahr. Deutsche med. Wochenschrift. 1908. Nr. 39.
- Siegert, Die Bedeutung der Pirquetschen Hautreaktion im 1. Lebensjahr. Versammlung der rhein.-westfäl. und niederrhein. Kinderärzte. Referat. Monatsschrift für Kinderheilkunde. 1908. S. 358.
- Sitzenfrey, Die Lehre von der kongenitalen Tuberkulose. Berlin. Karger. 1909.
- Stirnemann, Tuberkulose im 1. Lebensjahr. Jahrbuch für Kinderheilkunde. 1905. Bd. 61.
- Wassermann, Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose im frühen Kindesalter. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1894. Bd. 12.
- Weber, Die Tuberkulose des Menschen und der Tiere. Kolle-Wassermann, Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. I. Ergänzungsband. 1907.
- Weinberg, Die familiäre Belastung der Tuberkulösen und ihre Bedeutung zu Infektion und Vererbung. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. 1907. Bd. 7.
- Weinberg, Zur Frage des Schicksals der Kinder tuberkulöser Mütter und des künstl. Abortus. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. 1908. Bd. 11.
- Zarfl, Mitteilungen der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien. 1912.
- Zarfl, Zeitschrift für Kinderheilkunde. 1912. Heft 4.

Lebenslauf.

Ich bin im Jahre 1883 in Nürnberg als Sohn des Kaufmanns Gustav Frankenau geboren. Nach Absolvierung des neuen Gymnasiums zu Nürnberg studierte ich Medizin in Erlangen, München und Berlin. Das Physikum bestand ich 1904 in Erlangen, das Staatsexamen 1907 in München. Von April bis Oktober 1907 diente ich mit der Waffe beim 19. Inf.-Reg. (Erlangen). Ich war dann bis Februar 1908 als Medizinalpraktikant an der Irrenanstalt Hildburghausen, dann in gleicher Stellung am Cnopfschen Kinderspital in Nürnberg, wo ich auch nach meiner Approbation (Oktober 1908) als Assistent bis August 1909 verblieb. Von Oktober 1909 bis Mai 1910 diente ich in München und Ingolstadt als Einjähriger- und Unterarzt. Von Mai bis Oktober 1910 war ich Assistent an der chirurgischen Abteilung des städt. Krankenhauses in Bamberg. Von November 1910 bis jetzt war ich an den akademischen Kinderkliniken in Cöln tätig.
